

TROCHĘ POWTÓRKI Z HIPERTENSJOLOGII

Pytania mają charakter wielokrotnego wyboru, to znaczy 1–4 odpowiedzi mogą być poprawne.

- 1. W leczeniu nadciśnienia tętniczego indukowanego cyklosporyną najkorzystniej działają:**
 - A. diuretyki tiazydowe
 - B. β -adrenolityki
 - C. antagoniści wapnia
 - D. inhibitory konwertazy angiotensyny
 - E. sartany
- 2. Zatrucie następującymi pierwiastkami może prowadzić do nadciśnienia tętniczego:**
 - A. lit
 - B. magnez
 - C. ołów
 - D. wapń
 - E. żelazo
- 3. Erytropoetyna stosowana w niewydolności nerek wykazuje efekt hipotensyjny, ponieważ zmniejsza stopień niedokrwistości.**
 - A. obydwie prawdziwe, związek przyczynowy
 - B. obydwie prawdziwe, bez związku
 - C. pierwsze prawdziwe, drugie fałszywe
 - D. pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe
 - E. obydwie fałszywe
- 4. Porównanie korzyści skojarzonej terapii „nowymi” *versus* skojarzonej terapii „starymi” lekami hipotensyjnymi miało miejsce u większości pacjentów w dużych próbach klinicznych:**
 - A. VALUE i ASCOT
 - B. ALLHAT i LIFE
 - C. VALUE i ALLHAT
 - D. LIFE i INVEST
 - E. ASCOT i INVEST
- 5. Podwojenie dawki większości leków przeciwnadciśnieniowych zwiększa efekt hipotensyjny o:**
 - A. 15%
 - B. 30%
 - C. 50%
 - D. 80%
 - E. 100%
- 6. U chorych z nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym obserwuje się:**
 - A. wzrost PWV i wzrost podatności naczyń
 - B. spadek PWV i wzrost podatności naczyń
 - C. wzrost PWV i spadek podatności naczyń
 - D. spadek PWV i spadek podatności naczyń
 - E. wzrost PWV i prawidłową podatność naczyń
- 7. Wszyscy chorzy z nadciśnieniem tętniczym powinni otrzymywać kwas acetylosalicylowy, ponieważ u nich często obserwuje się stan prozakrzepowy.**
 - A. obydwie prawdziwe, związek przyczynowy
 - B. obydwie prawdziwe, bez związku
 - C. pierwsze prawdziwe, drugie fałszywe
 - D. pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe
 - E. obydwie fałszywe
- 8. Ewentualne korzyści terapii pozahipotensyjnej kwasem acetylosalicylowym lub statyną u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym testowano w następujących dużych badaniach klinicznych:**
 - A. HOT i ASCOT
 - B. HOPE i ASCOT
 - C. LIFE i ALLHAT
 - D. LIFE i HOPE
 - E. HOT i ALLHAT
- 9. U osób z nadciśnieniem tętniczym współistniejącym z chorobą wieńcową i chorobą naczyń obwodowych nie należy stosować β -adrenolityków, ponieważ mogą one pogarszać przepływ obwodowy w kończynach dolnych.**
 - A. obydwie prawdziwe, związek przyczynowy
 - B. obydwie prawdziwe, bez związku
 - C. pierwsze prawdziwe, drugie fałszywe
 - D. pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe
 - E. obydwie fałszywe
- 10. Nadciśnienie indukowane wysiłkiem jest charakterystyczne dla osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia z:**
 - A. koarktacją aorty
 - B. stenozą aortalną
 - C. niedomykalnością aortalną
 - D. otworem międzyprzedsionkowym
 - E. otworem międzykomorowym

11. U pacjentów z akromegalią nadciśnieniu tętniczemu najczęściej towarzyszą:

- A. LVH i udar mózgu
- B. LVH i niewydolność wieńcowa
- C. LVH i kardiomiopatia
- D. niewydolność krążenia i niewydolność nerek
- E. niewydolność wieńcowa i niewydolność nerek

12. U pacjentów z nadczynnością tarczycy częściej wzrasta ciśnienie skurczowe, ponieważ mechanizm nadciśnienia polega u nich na wzroście oporu obwodowego.

- A. obydwa prawdziwe, związek przyczynowy
- B. obydwa prawdziwe, bez związku
- C. pierwsze prawdziwe, drugie fałszywe
- D. pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe
- E. obydwa fałszywe

13. U pacjentów z niedoczynnością tarczycy częściej wzrasta ciśnienie skurczowe, ponieważ mechanizm nadciśnienia polega u nich na wzroście oporu obwodowego.

- A. obydwa prawdziwe, związek przyczynowy
- B. obydwa prawdziwe, bez związku
- C. pierwsze prawdziwe, drugie fałszywe
- D. pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe
- E. obydwa fałszywe

14. Hipotonia ortostatyczna występuje u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym z częstością:

- A. 1–2%
- B. 2–5%
- C. 10–30%
- D. 50–60%
- E. 50%

15. Rozpoznanie hipotonii ortostatycznej oznacza spadek w pozycji stojącej ciśnienia skurczowego lub rozkurczowego odpowiednio o:

- A. 10/10 mm Hg
- B. 20/10 mm Hg
- C. 10/20 mm Hg
- D. 20/20 mm Hg
- E. 30/30 mm Hg

Odpowiedzi: 1C; 2A; 3D; 4E; 5B; 6C; 7D; 8A; 9D; 10A; 11C; 12C; 13D; 14C; 15B