

Stanowisko *American Diabetes Association*

Zmiany wprowadzone w publikacji ADA *Clinical Practice Recommendations* w 2003 roku

Summary of revisions for the 2003 Clinical Practice Recommendations

Przedrukowano za zgodą z: *Diabetes Care* 2003, 26, supl. A, S3

Nowe rozdziały dotyczące zaleceń klinicznych

- rozdział *Retinopatia cukrzycowa* napisano od nowa — zawiera on klasyfikację dowodów opartą na systemie opracowanym przez ADA.

Zmiany dotyczące innych zaleceń

- Następujące zalecenia poddano istotnym zmianom:
- Standardy opieki medycznej nad chorymi na cukrzycę*
- dodano tabelę pokazującą związek między stężeniem HbA_{1c} a średnimi stężeniami glukozy w osoczu;
 - dodano tabelę podsumowującą cele leczenia dotyczące stężenia glukozy, lipidów oraz wartości ciśnienia tętniczego;
 - wyjaśniono, że ocena mikroalbuminurii powinna się zaczynać zbadaniem stosunku albuminy do kreatyniny w przygodnej próbce moczu;
 - zaktualizowano zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego i nefropatii.

Leczenie nadciśnienia tętniczego u dorosłych chorych na cukrzycę

- zaktualizowano zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego.

Nefropatia cukrzycowa

- zaktualizowano zalecenia dotyczące leczenia nefropatii.

Oznaczanie glikemii u chorych na cukrzycę

- dodano tabelę dotyczącą związku między stężeniem HbA_{1c} a średnimi stężeniami glukozy w osoczu;

Zasady insulinoterapii

- dodano informacje dotyczące postępowania w razie konieczności używania preparatów insuliny pochodzących od innego producenta niż dotychczas;
- dodano informacje dotyczące użycia strzykawk insuliny z zamontowanym zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu ukłuciu.

Copyright © 2003 by *American Diabetes Association*, Inc.

ADA nie odpowiada za poprawność tłumaczenia

Diabetologia Praktyczna 2003, tom 4, supl. A, A5

Tłumaczenie: lek. Magdalena Sildatke-Bauer

Wydanie polskie: Via Medica