

## ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE EDUKACYJNYM „FORUM MEDYCyny RODZINNEJ”

### Informacje ogólne

1. Program edukacyjny publikowany na łamach dwumiesięcznika „Forum Medycyny Rodzinnej” jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.
2. W każdym numerze „Forum Medycyny Rodzinnej” znajdzie się 20 pytań testowych. Za prawidłową odpowiedź na jedno pytanie uczestnik otrzymuje 0,2 punktu edukacyjnego.  
Na każde pytanie prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.  
W 6 tegorocznych wydaniach „Forum Medycyny Rodzinnej” zostanie opublikowanych 120 pytań testowych, w sumie lekarz może zdobyć 24 punkty.
3. Każdy lekarz zainteresowany udziałem w programie edukacyjnym może się do niego przyłączyć w dowolnym momencie poprzez odesłanie formularza zgło-

szeniowego oraz wypełnionej karty odpowiedzi na adres redakcji. Do uczestników, którzy zgłosili się do programu, zostaną wysłane indywidualne kody paskowe.

4. Po zakończeniu cyklu rocznego uczestnicy programu otrzymają certyfikaty ze zgromadzoną liczbą punktów edukacyjnych, potwierdzoną przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.
5. Termin nadsyłania odpowiedzi na pytania zamieszczone w tym numerze — **30.08.2010 r.**
6. Odpowiedzi należy udzielać:  
— na stronie internetowej [www.fmr.viamedica.pl](http://www.fmr.viamedica.pl) lub  
— na oryginalnej karcie zamieszczonej w zeszytce „Forum Medycyny Rodzinnej”, którą należy odesłać na adres:

Wydawnictwo Via Medica  
ul. Świętokrzyska 73  
80-180 Gdańsk

1. **Do specjalistycznego ośrodka celem przeprowadzenia kwalifikacji i ewentualnego zabiegu wszczepienia defibrylatora powinien być bezwzględnie kierowany każdy pacjent:**
  - A. po epizodzie zatrzymania krążenia w mechanizmie tachyarytmii komorowej
  - B. z niewydolnością serca i obniżoną kurczliwością lewej komory
  - C. po omdleniu
  - D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
  - E. odpowiedzi A i B są prawidłowe
2. **Pacjent z wszczepionym kardiowerterem–defibrylatorem wymaga konsultacji w przypadku:**
  - A. kilku interwencji ICD w krótkim czasie
  - B. wystąpienia utrwalonej arytmii komorowej nieprzerwanej przez defibrylator
  - C. podejrzenia infekcji łoży ICD
  - D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
  - E. odpowiedzi A i B są prawidłowe
3. **Które z wymienionych leków stosowanych doustnie mogą powodować wzrost progu defibrylacji?**
  - A. diltiazem
  - B. amiodaron
  - C. sildenafil
  - D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
  - E. odpowiedzi A i B są prawidłowe
4. **Zjawiskiem burzy elektrycznej u pacjenta z wszczepionym kardiowerterem–defibrylatorem określa się:**
  - A. uzasadnione wyładowania w liczbie 3 lub więcej na dobę

- B. chaotyczne pobudzenia z komór utrudniające analizę EKG
- C. pobudzenia powodowane przez balotującą elektrodę w komorze serca
- D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
- E. odpowiedzi A i B są prawidłowe
- 5. Wystąpienie burzy elektrycznej u pacjenta z wszczepionym kardiowerterem–defibrylatorem:**
- A. stanowi zagrożenie życia, więc należy skierować pacjenta bezzwłocznie do wysokospecjalistycznego ośrodka
- B. może być spowodowane zaburzeniami elektrolitowymi
- C. może ustąpić samoistnie
- D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
- E. odpowiedzi A i B są prawidłowe
- 6. Zakażenie układu defibrylującego po implantacji należy podejrzewać, gdy występują:**
- A. objawy ogólne wskazujące na proces zapalny
- B. ból i zaczerwienienie okolicy łoża defibrylatora
- C. utrata ruchomości urządzenia względem skóry
- D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
- E. odpowiedzi A i B są prawidłowe
- 7. Którego badania diagnostycznego nie można wykonać u pacjenta z implantowanym układem ICD:**
- A. badanie radiologiczne klatki piersiowej
- B. tomografia komputerowa klatki piersiowej
- C. tomografia komputerowa serca z podaniem kontrastu dożylnego
- D. mammografia
- E. rezonans magnetyczny kręgosłupa lędźwiowego
- 8. Przyłożenie magnesu do korpusu ICD:**
- A. powoduje wyłączenie detekcji ICD
- B. można zastosować w przypadku powtarzających się nieadekwatnych wyładowań ICD
- C. może spowodować uszkodzenie układu ICD
- D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
- E. odpowiedzi A i B są prawidłowe
- 9. U pacjentki operowanej z powodu raka sutka przed okresem menopauzy mogą wystąpić w obrębie blizny pooperacyjnej:**
- A. przykurcz kończyny górnej
- B. zmiany troficzne skóry klatki piersiowej
- C. ból i obrzęk
- D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
- E. odpowiedzi A i B są prawidłowe
- 10. Wczesne ostre powikłania po radioterapii występujące w toku leczenia i do 3 miesięcy po jego zakończeniu dotyczą przede wszystkim:**
- A. szpiku
- B. skóry
- C. nerwów
- D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
- E. odpowiedzi A i B są prawidłowe
- 11. Do późnych powikłań popromiennych skóry nie należą:**
- A. zanik wysypkowy skóry
- B. złuszczenia naskórka na wilgotno
- C. umiarkowana teleangiektazja
- D. całkowita depilacja
- E. owrzodzenia, martwica
- 12. Wyprysk atopowy powszechnie nazywany atopowym zapaleniem skóry (AZS):**
- A. jest chorobą ostrą dotyczącą skóry właściwej
- B. ma charakter nawrotowy
- C. występuje u 15% populacji dzieci w Polsce w wieku do 6. rż.
- D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
- E. odpowiedzi A i B są prawidłowe
- 13. Wyprysk atopowy:**
- A. w patogenezie istotną rolę odgrywają alergeny powietrzno pochodne
- B. u małych dzieci jest chorobą predysponującą do rozwoju astmy oskrzelowej w przyszłości
- C. w patogenezie istotną rolę odgrywa uczulenie na pokarmy
- D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
- E. odpowiedzi A i B są prawidłowe

- 14. Leczenie wyprysku wywołanego przez alergeny znajdujące się w żywności polega przede wszystkim na:**
- A. wyeliminowaniu z diety źle tolerowanego pokarmu
  - B. zastosowaniu miejscowego leczenia farmakologicznego
  - C. zastosowaniu ogólnego leczenia farmakologicznego
  - D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
  - E. odpowiedzi A i B są prawidłowe
- 15. W diagnostyce alergologicznej wyprysku atopowego zastosowanie mają:**
- A. punktowe i płatkowe testy skórne
  - B. oznaczenie alergenowo-swoistych przeciwciał klasy IgE
  - C. doustna prowokacja pokarmowa metodą podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo
  - D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
  - E. odpowiedzi A i B są prawidłowe
- 16. Doustna prowokacja pokarmowa metodą podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo (DBPCFC, *Double-Blind, Placebo-Controlled Oral Food Challenge*)**
- A. jest metodą referencyjną w diagnostyce wyprysku atopowego
  - B. polega na losowym podawaniu właściwego, czyli podejrzanego o wywoływanie objawów chorobowych pokarmu (*verum*) oraz identycznie wyglądającego i smakującego placebo
  - C. podczas próby prowokacji jedynie lekarz wie, kiedy stosowane jest *verum*, a kiedy placebo
  - D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
  - E. odpowiedzi A i B są prawidłowe
- 17. Zawroty nieukładowe:**
- A. są następstwem uszkodzeń samego błędnika
  - B. są następstwem uszkodzeń nerwu przedsionkowego
  - C. charakteryzuje je złudzenie niestabilności, niepewności postawy
  - D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
  - E. odpowiedzi A i B są prawidłowe
- 18. Przy rozpoznaniu hipertriglicydemii 300 mg/dl należy:**
- A. wdrożyć postępowanie nefarmakologiczne oraz leki z grupy fibratów
  - B. wykluczyć wtórne przyczyny hipertriglicydemii
  - C. wdrożyć terapię lekami z grupy statyn
  - D. postępowanie zależne jest od stężenia cholesterolu frakcji LDL
  - E. odpowiedzi B i D są prawidłowe
- 19. Przy stężeniach triglicerydów przekraczających 1000 mg/dl zwiększa się ryzyko:**
- A. rozwoju cukrzycy typu 2
  - B. wystąpienia epizodu ostrego zapalenia trzustki
  - C. szybkiego rozwoju kamicy żółciowej
  - D. zatorów tłuszczowych
  - E. zespołu nerczycowego
- 20. Do działań terapeutycznych zmniejszających stężenie triglicerydów nie należy:**
- A. zaprzestanie spożywania alkoholu
  - B. intensywne leczenie hipoglikemizujące
  - C. stosowanie diety o zawartości tłuszczów poniżej 15% całkowitej liczby kalorii
  - D. ograniczenie spożycia olejów rybich
  - E. zaprzestanie stosowania glikokortykosteroidów

**POPRAWNE ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PROGRAMU EDUKACYJNEGO ZAMIESZCZONEGO  
W „FORUM MEDYCYNY RODZINNEJ” 2010; 2**

1. D	11. D
2. A	12. E
3. D	13. B
4. A	14. E
5. E	15. E
6. A	16. E
7. B	17. A
8. D	18. E
9. D	19. E
10. E	20. E