

## ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE EDUKACYJNYM „FORUM MEDYCyny RODZINNEJ”

### Informacje ogólne

1. Program edukacyjny publikowany na łamach dwumiesięcznika „Forum Medycyny Rodzinnej” jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.
2. W każdym numerze „Forum Medycyny Rodzinnej” znajdzie się 20 pytań testowych. Za prawidłową odpowiedź na jedno pytanie uczestnik otrzymuje 0,2 punktu edukacyjnego.  
Na każde pytanie prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.  
W 6 tegorocznych wydaniach „Forum Medycyny Rodzinnej” zostanie opublikowanych 120 pytań testowych, w sumie lekarz może zdobyć 24 punkty.
3. Każdy lekarz zainteresowany udziałem w programie edukacyjnym może się do niego przyłączyć w dowolnym momencie poprzez odesłanie formularza zgło-

szeniowego oraz wypełnionej karty odpowiedzi na adres redakcji. Do uczestników, którzy zgłosili się do programu, zostaną wysłane indywidualne kody paskowe.

4. Po zakończeniu cyklu rocznego uczestnicy programu otrzymają certyfikaty ze zgromadzoną liczbą punktów edukacyjnych, potwierdzoną przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.
5. Termin nadsyłania odpowiedzi na pytania zamieszczone w tym numerze — **31.12.2009 r.**
6. Odpowiedzi należy udzielać:  
— na stronie internetowej [www.fmr.viamedica.pl](http://www.fmr.viamedica.pl) lub  
— na oryginalnej karcie zamieszczonej w zeszyście „Forum Medycyny Rodzinnej”, którą należy odesłać na adres:

Wydawnictwo Via Medica  
ul. Świętokrzyska 73  
80-180 Gdańsk

1. **Zarejestrowanymi do stosowania u dzieci poniżej 1 rż. miejscowymi preparatami glikokortykosteroidowymi w Polsce są:**
  - A. octan i maślan hydrokortyzonu
  - B. propionian flutikazonu
  - C. pirośluzan mometazonu
  - D. propionian klobetazolu
  - E. acetonid fluocinolonu
2. **Liczba jednostek FTU („jednostka opuszki palca”) zalecana do leczenia zmian chorobowych w obrębie palców, dłoni i grzbietu ręki u osoby dorosłej wynosi:**
  - A. 7 FTU
  - B. 4 FTU
  - C. 2,5 FTU
  - D. 2 FTU
  - E. 1 FTU
3. **Na ogniska hiperkeratotyczne, z tendencją do lichenifikacji zaleca się stosowanie miejscowych preparatów glikokortykosteroidowych w postaci:**
  - A. kremów
  - B. maści
  - C. lotionów
  - D. roztworów
  - E. żeli
4. **Cechy sugerujące nowotworowy charakter zmiany w badaniu ultrasonograficznym:**
  - A. niehomogeny charakter
  - B. brak wyraźnego ograniczenia od otaczających tkanek



