

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE EDUKACYJNYM „FORUM MEDYCyny RODZINNEJ”

Informacje ogólne

1. Program edukacyjny publikowany na łamach dwumiesięcznika „Forum Medycyny Rodzinnej” jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.
2. W każdym numerze „Forum Medycyny Rodzinnej” znajduje się 20 pytań testowych. Za prawidłową odpowiedź na jedno pytanie uczestnik otrzymuje 0,2 punktu edukacyjnego.
Na każde pytanie prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.
W 6 tegorocznych wydaniach „Forum Medycyny Rodzinnej” zostanie opublikowanych 120 pytań testowych, w sumie lekarz może zdobyć 24 punkty.
3. Każdy lekarz zainteresowany udziałem w programie edukacyjnym może się do niego przyłączyć w dowolnym momencie poprzez odesłanie formu-

larza zgłoszeniowego oraz wypełnionej karty odpowiedzi na adres redakcji. Do uczestników, którzy zgłosili się do programu, zostaną wysłane indywidualne kody paskowe.

4. Po zakończeniu cyklu rocznego uczestnicy programu otrzymają certyfikaty ze zgromadzoną liczbą punktów edukacyjnych, potwierdzoną przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.
5. Termin nadsyłania odpowiedzi na pytania zamieszczone w tym numerze — **29.02.2012 r.**
6. Odpowiedzi należy udzielać:
 - na stronie internetowej www.fmr.viamedica.pl lub
 - na oryginalnej karcie zamieszczonej w zeszytce „Forum Medycyny Rodzinnej”, którą należy odesłać na adres:

Wydawnictwo Via Medica
ul. Świętokrzyska 73
80–180 Gdańsk

1. **Cechą charakterystyczną zespołu żółtych paznokci jest/są:**
 - A. dystroficzne płytki paznokciowe o żółtym zabarwieniu
 - B. wrodzona hipoplazja naczyń chłonnych
 - C. wysięk w jamie opłucnej
 - D. obrzęk limfatyczny
 - E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
2. **Leczenie zespołu żółtych paznokci polega na:**
 - A. wyleczeniu choroby podstawowej
 - B. podawaniu witaminy E 400 mg/dobę
 - C. podawaniu itrakonazolu 400 mg/dobę przez tydzień w miesiącu, przez 3 miesiące
 - D. podawaniu flukonazolu 200 mg/tydzień
 - E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

3. **Klasyczna triada objawów Emersona z przebiegu zespołu żółtych paznokci to:**
 - A. żółte zabarwienie paznokci, obrzęk limfatyczny, zajęcie układu oddechowego
 - B. żółte zabarwienie paznokci, obrzęk limfatyczny, hipoplazja naczyń chłonnych
 - C. żółte zabarwienie paznokci, pogrubienie płytek paznokciowych, poprzeczne pobruzdowania paznokci
 - D. obrzęk limfatyczny, hipoplazja naczyń chłonnych, rozstrzenia oskrzeli
 - E. obrzęk limfatyczny, zajęcie układu oddechowego, *rhinosinusitis*

4. **Który z wymienionych niżej czynników wiąże się z większym niż statystyczne ryzykiem wystąpienia naczyniaka?**
- A. rasa kaukaska
 - B. ciąża mnoga
 - C. niska masa urodzeniowa
 - D. amniopunkcja
 - E. wszystkie wymienione
5. **Które ze stwierdzeń dotyczących naczyniaków niemowląt jest nieprawdziwe?**
- A. naczyniaki wymagają jak najszybszego włączenia leczenia
 - B. naczyniaki nie wymagają leczenia, ponieważ same ulegają involucji
 - C. długie wieloletnie utrzymywanie się naczyniaka stwarza ryzyko nowotworu złośliwego
 - D. leczenie chirurgiczne zostało całkowicie wyparte przez farmakoterapię
 - E. wszystkie wymienione stwierdzenia są nieprawdziwe
6. **Najbardziej skuteczną farmakologiczną metodą leczenia naczyniaków jest:**
- A. interferon α
 - B. propranolol
 - C. steroidoterapia systemowa
 - D. ostrzykiwanie steroidami
 - E. winkrystyna
7. **Działalność lecznicza:**
- A. może polegać na realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia
 - B. może polegać na promocji zdrowia
 - C. nie jest działalnością regulowaną
 - D. wszystkie powyższe stwierdzenia są prawidłowe
 - E. prawidłowe odpowiedzi to tylko A i B
8. **Podmiotem leczniczym, w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej, może być:**
- A. indywidualna praktyka lekarska
 - B. kościelna osoba prawna
 - C. fundacja
 - D. wszystkie powyższe stwierdzenia są prawidłowe
 - E. prawidłowe odpowiedzi to tylko B i C
9. **Przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego jest:**
- A. hospicjum
 - B. zakład opiekuńczo-leczniczy
 - C. szpital
 - D. wszystkie powyższe stwierdzenia są prawidłowe
 - E. prawidłowe odpowiedzi to tylko B i C
10. **Do głównych klinicznych objawów α -mannozydozy należą:**
- 1) **pogrubienie rysów twarzy i deformacje kostne**
 - 2) **zmiany dotyczące narządów zmysłów**
 - 3) **niewydolność nerek**
 - 4) **opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego**
 - 5) **zaburzenia odporności**
- Odpowiedzi:
- A. odpowiedzi 1, 2, 3, 4 są prawidłowe
 - B. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 - C. odpowiedzi 1, 2, 4, 5 są prawidłowe
 - D. odpowiedzi 1, 4 są prawidłowe
 - E. odpowiedzi 1, 2 są prawidłowe
11. **Alfa-mannozydoza jest:**
- A. chorobą metaboliczną dziedziczną w sposób autosomalny dominujący
 - B. chorobą bez udokumentowanego tła genetycznego
 - C. chorobą przewlekłą z możliwością stosowania enzymatycznej terapii zastępczej
 - D. chorobą przewlekłą rozpoznawaną głównie u osób dorosłych
 - E. chorobą przewlekłą będącą następstwem znacznego niedoboru enzymatycznego
12. **Leczenie dziecka z α -mannozydozą obejmuje:**
- A. podawanie brakującego enzymu (tzw. Enzymatyczna Terapija Zastępcza)
 - B. korekcję ortopedyczną klatki piersiowej i podudzi
 - C. częste antybiotykoterapie
 - D. prawidłowa odpowiedź to tylko B i C
 - E. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
13. **Do obrazu klinicznego przewlekłej hipotyreozy można zaliczyć:**
- A. obniżenie wydolności fizycznej z dusznością
 - B. podwyższone ciśnienie tętnicze
 - C. zwolnienie akcji serca

- D. wszystkie powyższe stwierdzenia są prawidłowe
E. prawidłowe odpowiedzi to tylko A i B
- 14. W przewlekłej hipotyreozy zmiany w EKG to:**
- A. zmniejszenie amplitudy QRS
B. blok przedsionkowo-komorowy I stopnia
C. skrócenie odstępu QT
D. wszystkie powyższe stwierdzenia są prawidłowe
E. prawidłowe odpowiedzi to tylko A i B
- 15. W przewlekłej hipotyreozy:**
- A. znacznie częściej w porównaniu z populacją ogólną dochodzi do wystąpienia bloku prawej odnogi pęczka Hisa (RBBB)
B. znacznie częściej w porównaniu z populacją ogólną występują komorowe zaburzenia rytmu
C. wymienione wyżej zaburzenia cofają się po doprowadzeniu pacjenta do eutyreozy
D. wszystkie powyższe stwierdzenia są prawidłowe
E. prawidłowe odpowiedzi to tylko A i B
- 16. W terapii niedoczynności tarczycy w grupie pacjentów w podeszłym wieku:**
- A. początkowe dawki L-T4 nie powinny przekraczać 25 $\mu\text{g}/\text{dobę}$
B. początkowe dawki L-T4 nie powinny przekraczać 50 $\mu\text{g}/\text{dobę}$
C. początkowe dawki L-T4 przy udokumentowanym wywiadzie wieńcowym nie powinny przekraczać 25 $\mu\text{g}/\text{dobę}$
D. prawidłowe odpowiedzi to tylko A i C
E. prawidłowe odpowiedzi to tylko B i C
- 17. Objawy pacjenta z wolem, który wymaga hospitalizacji to:**
- A. duszność, zaburzenia połykania, uczucie dławienia lub ucisku w obrębie szyi
B. obrzęk, sinica i przekrwienie żyłne twarzy oraz ramion, nadmierne wypełnienie żył szyjnych
- C. bledność powłok, obrzęk twarzy (głównie okolic oczodołów) oraz kończyn dolnych, głębokie od-ruchy ścięgna opóźnione, chwiejność emocjonalna, znużenie, apatia
D. wszystkie powyższe stwierdzenia są prawidłowe
E. prawidłowe odpowiedzi to tylko A i B
- 18. Przyczyny podwyższonego stężenia aminotransferaz to:**
- A. intensywne ćwiczenia fizyczne
B. hemoliza wewnątrz i zewnątrzkrążeniowa erytro-cytów
C. zawał serca
D. wszystkie powyższe stwierdzenia są prawidłowe
E. prawidłowe odpowiedzi to tylko B i C
- 19. Zespół Hoffmana:**
- A. występuje u osób z niedoczynnością tarczycy
B. objawia się osłabieniem mięśni
C. cechą charakterystyczną jest przerost rzekomy mięśni
D. wszystkie powyższe stwierdzenia są prawidłowe
E. wszystkie stwierdzenia są fałszywe
- 20. W niedoczynności tarczycy:**
- A. ponad 50% pacjentów zgłasza bóle mięśniowe
B. obserwuje się zwiększoną skłonność do zaburzeń koncentracji i pamięci
C. obserwuje się zwiększoną skłonność do neuropatii z ucisku, na przykład zespołu cieśni nadgarstka
D. wszystkie powyższe stwierdzenia są prawidłowe
E. prawidłowe odpowiedzi to tylko A i B

**POPRAWNE ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PROGRAMU EDUKACYJNEGO ZAMIESZCZONEGO
W „FORUM MEDYCYNY RODZINNEJ” 2011; 5**

- | | |
|-------|-------|
| 1. E | 11. E |
| 2. E | 12. A |
| 3. E | 13. E |
| 4. B | 14. E |
| 5. C | 15. C |
| 6. D | 16. A |
| 7. B | 17. A |
| 8. D | 18. D |
| 9. D | 19. E |
| 10. D | 20. C |