

Pytania testowe

Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy na temat zagadnień omawianych w niniejszym numerze „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej”.

Pytanie 1.

Do technik ultrasonografii trójwymiarowej zalicza się:

- A. *Surface rendering mode, HD-live, visual-HD*
- B. *HD-surface rendering mode, glass body mode, silhouette*
- C. *Maximum rendering mode, basic mode*
- D. *HD-live, silhouette, visual-HD*

Pytanie 2.

Co nie ogranicza prawidłowej wizualizacji płodu podczas badania USG 3D?

- A. Małowodzie
- B. Główka „nisko schodząca”
- C. Hipotrofia płodu
- D. Pętla pępowiny

Pytanie 3.

Której z wymienionych struktur według dotychczasowych doniesień nie można skutecznie ocenić za pomocą ultrasonografii 3D?

- A. Wargi oraz podniebienie
- B. Długość kości nosowej
- C. Grubość tkanki podskórnej w okolicy grzbietu nosa
- D. Kąt czołowo-szczękowy twarzoczaszki

Pytanie 4.

Wskaż najbardziej istotny czynnik ryzyka wystąpienia nietrzymania moczu:

- A. Otyłość
- B. Wiek
- C. Stosowanie systemowej estrogenoterapii w hormonalnej terapii menopauzy

Pytanie 5.

Najbardziej istotnym czynnikiem rozwoju zaburzeń statyki narządu płciowego jest:

- A. Wzrost masy ciała
- B. Histerektomia brzuszna
- C. Przebyty poród

Pytanie 6.

W przypadku oceny jakości życia pacjentek z obniżaniem narządu płciowego nie stosuje się kwestionariusza:

- A. *Pelvic Floor Impact Questionnaire (PFIQ)*
- B. *Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI)*
- C. *Pelvic Organ Prolaps Quantification (POP-Q)*

Pytanie 7.

W Polsce odsetek przeszczepień nerek od dawców żywych wynosi:

- A. 2,4%
- B. 3%
- C. 4,9%
- D. 8,4%

Pytanie 8.

W kohortowym badaniu Garga i wsp., przeprowadzonym w latach 1992–2009, stwierdzono, że u ciężarnych dawczyń nerki w porównaniu z ogólną populacją ciężarnych występuje większe ryzyko:

- A. Nadciśnienia tętniczego
- B. Białkomoczu
- C. Porodu przedwczesnego
- D. Odpowiedzi A i B są prawidłowe

Pytanie 9.

Zaznacz prawidłową odpowiedź na temat ciąży po donacji nerki:

- A. Wcześniejsze dawstwo nerki jest wskazaniem do ukończenia ciąży drogą cięcia cesarskiego
- B. Należy odradzać kobiecie ciążę po donacji nerki
- C. Po dawstwie nerki należy odczekać rok przed zajściem w ciążę
- D. Dotychczas przeprowadzone badania wspierają kliniczne doświadczenia, że ciąża po donacji nerki jest bezpieczna

Pytanie 10.

Zalecana dzienna dawka witaminy D3 dla kobiety w ciąży to:

- A. 1000 IU
- B. 1500 IU
- C. 2000 IU
- D. 2500 IU

Pytanie 11.

Czynnikiem ułatwiającym jelitowe wchłanianie wapnia jest:

- A. Witamina D3
- B. Magnez
- C. Jod
- D. Błonnik pokarmowy

Pytanie 12.

W przypadku zwiększonego ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego zalecana dzienna dawka kwasu dokozaheksaenowego (DHA) to:

- A. 400 mg
- B. 600 mg
- C. 800 mg
- D. 1000 mg

Pytanie 13.

Jakie miasto w Austrii jest siedzibą Fundacji Amerykańsko-Austriackiej?

- A. Salzburg
- B. Linz
- C. Graz

Pytanie 14.

Ile miesięcy wynosi maksymalny czas trwania stypendium wyjazdowego Otwartego Instytutu Medycznego (OMI)?

- A. 3 miesiące
- B. 6 miesięcy
- C. 2 miesiące

Pytanie 15.

Jakie informacje na temat picia alkoholu przez kobietę w ciąży należy zebrać, aby określić ryzyko FASD?

- A. Informację na temat wzoru picia alkoholu w ciągu 3 miesięcy przed ciążą
- B. Informację dotyczącą częstości, ilości jednorazowo, ogólnego poziomu i stylu
- C. Informację dotyczącą picia alkoholu w czasie ciąży
- D. Należy zebrać informacje określone w obu powyższych punktach

Pytanie 16.

Analiza smółki pod kątem ekspozycji płodu na działanie alkoholu:

- A. Może zastąpić wywiad na temat picia alkoholu przez kobietę przed ciążą i w czasie ciąży
- B. Może być przeprowadzona bez świadomej zgody kobiety
- C. Może potwierdzić picie alkoholu przez kobietę w drugim i trzecim trymestrze ciąży

Pytanie 17.

Jakie obszary powinna obejmować diagnoza FASD?

- A. Postnatalne zaburzenia wzrostu, zaburzenia funkcjonowania OUN, ryzyko ekspozycji na alkohol w życiu płodowym
- B. Ocenę kluczowych dysmorfii twarzy, zaburzenia OUN, ryzyko ekspozycji na alkohol w życiu płodowym, prenatalne i/lub postnatalne zaburzenia wzrostu
- C. Ocenę kluczowych dysmorfii twarzy, ryzyko ekspozycji na alkohol w życiu płodowym, prenatalne i/lub postnatalne zaburzenia wzrostu, obwód głowy dziecka