

Pytania testowe

Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy na temat zagadnień omawianych w niniejszym numerze „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej”.

Pytanie 1.

Które produkty wykazują działanie tzw. wolotwórcze?

- A. rzepa, brukselka, brokuły
- B. pasternak, rzodkiew, bataty
- C. cukinia, dynia, brokuły
- D. soja, ogórek, pomidor

Pytanie 2.

Co zawierają w składzie glukozytolany?

- A. siarkę, fruktozę, resztę aminokwasową
- B. glukozę, siarkę, resztę aminokwasową
- C. C. maltozę, glukozę, laktozę
- D. fruktozę, azot, resztę aminokwasową

Pytanie 3.

Jaką ilość spożycia jodu zaleca Światowa Organizacja Zdrowia?

- A. 220 µg
- B. 250 µg
- C. 300 µg
- D. 330 µg

Pytanie 4.

Opryszczkę genitalną należy różnicować z: 1) kiłą, 2) wrzodem miękkim, 3) rzeżączką, 4) nadwrażliwością na leki, 5) chorobą Behçeta, 6) leukoplakią.

- A. 1–6
- B. 1, 2, 4, 5
- C. 1–4
- D. 2, 4–6

Pytanie 5.

Współczesna diagnostyka laboratoryjna opryszczki genitalnej polega na:

- A. Wykrywaniu przeciwciał przeciw HSV-1 lub HSV-2 w surowicy
- B. Wykazaniu obecności materiału genetycznego HSV-1 lub HSV-2 w aspiracie z pęcherzyka lub wymazie z nadżerki
- C. Wykazaniu obecności charakterystycznych zmian cytopatycznych w badaniu cytologicznym (np. test Tzancka lub Papanicolaou)

Pytanie 6.

Wynik, którego badania najsilniej uzależniony jest od prawidłowo wykonanych procedur przedlaboratoryjnych (dobór oraz sposób pobrania i przechowywania próbki materiału klinicznego) w diagnozowaniu opryszczki genitalnej:

- A. Real-time PCR
- B. PCR
- C. Metoda izolacji wirusa w hodowli komórkowej
- D. Badanie serologiczne

Pytanie 7.

Przy odpływananiu płynu owodniowego bez czynności skurczowej w ciąży powyżej 36 tygodnia do preindukcji porodu można stosować:

- A. Dinoproston żel
- B. Misoprostol insert
- C. Cewnik Foley'a
- D. Dinoproston insert
- E. Żadne z powyższych

Pytanie 8.

Tachystole rozpoznajemy, jeśli:

- A. Występuje co najmniej 5 skurczów macicy w ciągu 10 min
- B. Skurcz macicy trwa powyżej 2 minut
- C. Występują zaburzenia tętna płodu
- D. Prawdziwe A i B
- E. Prawdziwe tylko jeśli A, B i C występują łącznie

Pytanie 9.

Po zastosowaniu prostaglandyn oksytcynę we wlewie kroplowym w celu stymulacji czynności skurczowej można najwcześniej zastosować:

- A. Bezpośrednio po usunięciu insertu misoprostolu z pochwy
- B. Po 120 min od usunięcia insertu misoprostolu z pochwy
- C. 60 min po zaaplikowaniu żelu z dinoprostonem, jeśli nie wystąpią skurcze macicy
- D. 30 min od usunięcia insertu dinoprostonu z pochwy
- E. 24 godziny po zastosowaniu dopochwowym jakichkolwiek prostaglandyn

Pytanie 10.

Maksymalna dawka oksytcyny, którą można stosować w trakcie porodu po cięciu cesarskim to:

- A. 10 mU/min
- B. 20 mU/min
- C. 30 mU/min
- D. 40 mU/min

Pytanie 11.

Bez względu na przeciwwskazaniem do próby porodu pochwowego po cięciu cesarskim (VBAC) jest:

- A. Stan po dwóch cięciach cesarskich
- B. Odstęp od ostatniego porodu < 18 miesięcy
- C. Brak informacji o rodzaju nacięcia macicy podczas poprzedniego cięcia cesarskiego
- D. Brak możliwości i zaplecza do wykonania cięcia cesarskiego w trybie nagłym

Pytanie 12.

Najczęstszym objawem pęknięcia macicy podczas VBAC jest:

- A. Ból w rzucie blizny
- B. Krwawienie z dróg rodnych
- C. Nieprawidłowy zapis KTG
- D. Objaw „cofnięcia” się części przodującej w kanale rodnym

Prawidłowe odpowiedzi: 1A, 2B, 3B, 4B, 5B, 6C, 7B, 8D, 9D, 10B, 11D, 12C