

Pytania testowe

Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy na temat zagadnień omawianych w niniejszym numerze „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej”.

Pytanie 1.

IV stopień wyciowania macicy występuje wtedy, gdy:

- A. Dno macicy nie przekracza pierścienia szyjki macicy
- B. Dno macicy poniżej szpary sromowej
- C. Całkowite wywinicie i wypadnięcie macicy z częścią pochwy przed szparę sromową
- D. Dno macicy poniżej pierścienia szyjki nie dochodzi do szpary sromowej

Pytanie 2.

Śmiertelność pacjentek w przypadku wystąpienia wyciowania macicy sięga:

- A. 15%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 50%

Pytanie 3.

Najbardziej przydatnym i najszybszym badaniem diagnostycznym w przypadku niecałkowitego wyciowania macicy i trudności diagnostycznych jest:

- A. RTG jamy brzusznej
- B. Tomografia komputerowa jamy brzusznej
- C. Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej
- D. USG miednicy mniejszej wykonane na sali porodowej

Pytanie 4.

Leczeniem pierwszego rzutu dolegliwości uroginekologicznych jest:

- A. Pessaroterapia
- B. Farmakoterapia i fizjoterapia
- C. Leczenie operacyjne

Pytanie 5.

Pessar cewkowy jest najczęściej stosowany w leczeniu:

- A. Wysiłkowego nietrzymania moczu bez POP
- B. Wysiłkowego nietrzymania moczu z POP
- C. POP
- D. Nietrzymania stolca

Pytanie 6.

Do najczęstszych powikłań pessarów zakładanych na stałe do pochwy należą:

- A. Uplawy i erozje pochwy
- B. Uwięźnięcie szyjki macicy

- C. Przetoka do jelita
- D. Przetoka do pęcherza moczowego

Pytanie 7.

Pessar kostkowy jest najczęściej stosowany w leczeniu:

- A. Wysiłkowego nietrzymania moczu bez POP
- B. Wysiłkowego nietrzymania moczu z POP
- C. POP
- D. Nietrzymania stolca

Pytanie 8.

Pessar cewkowy kołnierzykowy jest najczęściej stosowany w leczeniu:

- A. Wysiłkowego nietrzymania moczu bez POP
- B. Wysiłkowego nietrzymania moczu z POP
- C. POP
- D. Nietrzymania stolca

Pytanie 9.

Definicja wczesnego krwotoku poporodowego określa krwotok, który wystąpił:

- A. W ciągu pierwszych 24 godzin po porodzie
- B. W ciągu pierwszych 2 godzin po porodzie
- C. Po porodzie, niezależnie od kryterium czasowego
- D. Po porodzie drogami natury, bez kryterium ilości utraconej krwi

Pytanie 10.

Lekiem pierwszego rzutu w terapii atonii macicy jest:

- A. Mizoprostol, podany podjęzykowo w dawce 800 mcg.
- B. Kwas traneksamowy, podany dożylnie w dawce 1 g.
- C. Sulproston, podany dożylnie w dawce 500 mcg.
- D. Oksytocyna, podana dożylnie w bolusie w dawce 10 IU i następnie kontynuowana w ciągłym wlewie dożylnym

Pytanie 11.

Najczęstszą przyczyną krwotoku poporodowego jest:

- A. Uraz szyjki macicy z uszkodzeniem gałązek naczyń zstępujących i/lub tętnicy macicznej
- B. Skaza krwotoczna o ciężkim przebiegu w postaci nabytej hemofilii
- C. Hipotonia lub atonia macicy
- D. Ujawniająca się po porodzie choroba von Willebranda

Prawidłowe odpowiedzi: 1. C, 2. B, 3. D, 4. A, B, 5. A, 6. A, 7. C, 8. B, 9. A, 10. D, 11. C.