

Pytania testowe

Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy na temat zagadnień omawianych w niniejszym numerze „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej”.

Pytanie 1.

Silnym czynnikiem ryzyka wystąpienia konieczności wykonania okołoporodowego wycięcia macicy jest:

- A. Przebycie w wywiadzie licznych ciąż, szczególnie zakończonych drogą cięcia cesarskiego
- B. Wiek < 35 lat
- C. Pierworództwo
- D. Ciąża pojedyncza

Pytanie 2.

Częstość wykonywania histerektomii okołoporodowych:

- A. Wzrasta
- B. Zmniejsza się
- C. Utrzymuje się na stałym poziomie
- D. Brak danych

Pytanie 3.

Najczęściej wymieniane przyczyny wykonania histerektomii okołoporodowej to:

- A. Mięśniaki macicy
- B. Nieprawidłowości implantacji łożyska, atonia macicy
- C. Sterylizacja na życzenie pacjentki
- D. Schorzenia ginekologiczne

Pytanie 4.

Varicella Zoester Virus:

- 1) jako infekcja pierwotna wywołuje ospę wietrzną, a jako wtórna półpaśca;
- 2) wymaga leczenia antybiotykiem;
- 3) w leczeniu skuteczny jest m.in. acyklowir;
- 4) wewnątrzmaciczna transmisja wirusa jest niebezpieczna dla płodu;
- 5) przy infekcji wtórnej w ciąży najczęściej dochodzi również do infekcji płodu;
- 6) nie istnieje swoista immunoglobulina przeciwko VZV;
- 7) dostępne są szczepionki chroniące zarówno przed infekcją pierwotną jak i wtórna;
- 8) dostępne są jedynie szczepionki chroniące przed infekcją pierwotną.

Prawdziwe są twierdzenia:

- A. 1, 2, 4, 7
- B. 2, 3, 5, 6
- C. 1,3, 6, 8
- D. 1, 3, 4, 7

Pytanie 5.

Prawdą jest, że ospa wietrzna w ciąży:

- A. Nie wymaga poszerzonej diagnostyki w stosunku do populacji ogólnej
- B. Stanowi takie samo zagrożenie dla płodu jak półpaśiec
- C. Zawsze wymaga obowiązkowego leczenia pacjentki
- D. Nie może skutkować półpaścem u dziecka

Pytanie 6.

Nie jest prawdą, że półpaśiec w ciąży:

- A. Stanowi duże ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego płodu
- B. Skłania do wnikliwej oceny płodu w badaniach prenatalnych
- C. Nie jest wskazaniem do leczenia przeciwwirusowego każdej pacjentki
- D. Nie wiąże się z koniecznością izolacji pacjentki

Pytanie 7.

Podczas ciąży zachodzi zmiana składu żółci pod względem proporcji między kwasami żółciowymi hydrofilnymi a hydrofobowymi.

- A. Największy spadek kwasów hydrofobowych obserwuje się w II trymestrze ciąży
- B. Największy wzrost kwasów hydrofobowych obserwuje się w III trymestrze ciąży
- C. Wraz z czasem trwania ciąży rośnie stężenie hydrofilowych kwasów żółciowych
- D. Największy wzrost stężenia kwasów hydrofilowych obserwuje się w I trymestrze ciąży

Pytanie 8.

UDCA najczęściej stosowany jest doustnie w dawce:

- A. 5–7 mg/kg/dobę
- B. 500–700 mg/dobę
- C. 750–900 mg/dobę
- D. > 1000 mg/dobę

Pytanie 9.

Zakończenie ciąży w przypadku stężenia kwasów żółciowych we krwi ciężarnej między 40–99 $\mu\text{mol/l}$ powinno być rozważone po ukończeniu

- A. 37 tygodnia ciąży
- B. 38 tygodnia ciąży
- C. 34 tygodnia ciąży
- D. 36 tygodnia ciąży

Pytanie 10.

Antybiotykiem I rzutu stosowanym w zapaleniu piersi jest:

- A. Amoksycyлина
- B. Cefuroksm
- C. Cefadroksyl
- D. Amoksycyлина z kw. klawulanowym

Pytanie 11.

Bezwzględny przeciwwskazaniem do karmienia piersią jest:

- A. Zapalenie piersi u matki
- B. Fenylketonuria u dziecka
- C. Gorączka u matki
- D. Zakażenie HIV u matki w krajach rozwiniętych

Pytanie 12.

Wskaż zdanie prawdziwe:

- A. Niedostateczna podaż kalorii w diecie matki karmiącej < 1500 kcal/dobę nie wpływa na ilość produkowanego przez nią pokarmu.
- B. Niedobory pokarmowe w diecie kobiety karmiącej nie wpłyną istotnie na wartościowość produkowanego przez nią pokarmu.
- C. Intensywny wysiłek fizyczny jest przeciwwskazany w czasie laktacji.
- D. Matki karmiące powinny stosować specjalną dietę z ograniczeniem spożywania napojów gazowanych czy roślin strączkowych.

Pytanie 13.

Szansa na spontaniczną owulację u kobiet z pierwotną niewydolnością jajników wynosi:

- A. 2-3%
- B. 4-5%
- C. 10-11%
- D. 12-13%

Pytanie 14.

Zalecany sposób leczenia niepłodności u kobiet z POI jest:

- A. Terapia glikokortykosteroidami
- B. Terapia analogami GnRH oraz gonadotropinami
- C. Donacja (adopcja) zarodków
- D. Zapłodnienie metodą IVF z oocytem dawczyni

Pytanie 14.

Przyczyną pierwotnej niewydolności jajników może być:

- A. Fenylketonuria
- B. Mutacja genu FMR1
- C. Niewydolność kory nadnerczy
- D. Nadczynność kory nadnerczy