

## Pytania testowe

Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy na temat zagadnień omawianych w niniejszym numerze „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej”.

### Pytanie 1.

Zespół niewrażliwości na androgeny jest warunkowany genetycznie przez mutacje powodujące:

- A. Defekt budowy testosteronu
- B. Utratę funkcji receptora androgenowego
- C. Obniżoną aktywność enzymu 5 alfa reduktazy
- D. Defekt budowy dihydrotestosteronu

### Pytanie 2.

Zespół niewrażliwości na androgeny jest najczęściej dziedziczny:

- A. W sposób recesywny sprzężony z chromosomem X
- B. W sposób dominujący sprzężony z chromosomem X
- C. W sprzężeniu z chromosomem Y
- D. Powstaje *de novo*

### Pytanie 3.

Całkowity zespół niewrażliwości na androgeny:

- A. Charakteryzuje się żeńskim fenotypem i jednocześnie wysokimi poziomami androgenów charakterystycznymi dla mężczyzn
- B. Jest przyczyną pierwotnego braku miesiączki
- C. Może wiązać się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia rozrodzaka zarodkowego, nasieniaka, guzów z komórek Sertolego i Leydiga oraz hamartoma
- D. Wszystkie powyższe stwierdzenia są prawdziwe

### Pytanie 4.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, *World Health Organization*) podaje, że cięcie cesarskie redukuje śmiertelność matki i noworodka, jeśli jego odsetek wynosi:

- A. 5–10%
- B. 10–15%
- C. 15–20%
- D. 20–25%

### Pytanie 5.

Średni wiek kobiet rodzących na całym świecie:

- A. Nie zmienia się
- B. Wzrasta
- C. Maleje
- D. Brak danych

### Pytanie 6.

Tokofobia:

- 1) Stanowi istotny problem położniczy
- 2) Definiowana jest jako patologiczny lęk przed porodem drogami natury
- 3) Nie wpływa na sposób rozwiązania ciąży
- 4) Można ją podzielić na pierwszorzędową (dotyczącą wieloródek) oraz drugorzędową (dotyczącą pierworódek)

Prawidłowe są odpowiedzi:

- A. 1, 2, 3, 4
- B. 1, 3
- C. 1, 2, 3
- D. 1, 2

### Pytanie 7.

Ultraniskodawkowa dwuskładnikowa tabletki antykoncepcyjna (DTA) zawiera:

- A. 50 ug etynyloestradolu
- B. 35 ug etynyloestradolu
- C. 15 ug etynyloestradolu
- D. 2 mg walerianu estradiolu
- E. 1,5 mg estradiolu

### Pytanie 8.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące skuteczności dwuskładnikowej tabletki antykoncepcyjnej (DTA):

- A. Nadwaga i otyłość znacząco zmniejszają skuteczność DTA i kobiety z BMI > 25 kg/m<sup>2</sup> nie powinny stosować tej metody antykoncepcji
- B. Duże prospektywne badania kohortowe wskazują, że tylko w przypadku kobiet z otyłością II stopnia (BMI > 35 kg/m<sup>2</sup>), stosujących DTA, występuje podwyższone ryzyko zajścia w ciążę
- C. W badaniach obserwacyjnych wykazano liniowe obniżanie skuteczności DTA wraz ze zmniejszaniem zawartości etynyloestradolu (EE) w tabletkce antykoncepcyjnej
- D. Badania farmakokinetyczne dowiodły, że w przypadku otyłych kobiet stosujących DTA następuje obniżenie stężenia hormonów steroidowych w surowicy krwi (EE i gestagen) poniżej minimalnych stężeń terapeutycznych
- E. Skuteczność DTA, szczególnie ultraniskodawkowej, ulega znacznemu obniżeniu po 40 roku życia

### Pytanie 9.

Za potencjalne zmniejszenie spektrum objawów ubocznych w przypadku stosowania ultraniskodawkowej DTA dostępnej w Polsce, odpowiadają wszystkie wymienione poniżej mechanizmy, za wyjątkiem:

- A. Schemat stosowania 24/4
- B. Bardzo niska dawka etynyloestradolu (15 ug EE)
- C. Brak efektu antygonadotropowego zastosowanego gestagenu (60 ug gestodenu; GTD)
- D. Niska dawka zastosowanego gestagenu (60 ug GTD)
- E. Przedłużony okres półtrwania zastosowanego gestagenu (60 ug GTD)

Prawidłowe odpowiedzi: 1B, 2A, 3D, 4B, 5B, 6D, 7C, 8B, 9C

