

## Pytania testowe

Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy na temat zagadnień omawianych w niniejszym numerze „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej”.

### Pytanie 1.

Jaki jest stopień zaawansowania raka szyjki macicy w przypadku guza szyjki macicy o wielkości maksymalnej 4 cm, ograniczonego do szyjki macicy, bez powiększonych węzłów chłonnych w badaniach obrazowych?

- A. IA2
- B. IB1
- C. IB2
- D. IB3

### Pytanie 2.

Jaki jest stopień zaawansowania raka szyjki macicy w przypadku guza szyjki macicy o wielkości maksymalnej 3 cm, z naciekiem na lewe przymaciczne dochodzącym do kości oraz potwierdzonym histopatologicznie zmienionym węzłem pachwinowym prawym?

- A. IIB
- B. IIIB
- C. IIIC2
- D. IVB

### Pytanie 3.

Jaki jest stopień zaawansowania raka szyjki macicy w przypadku guza szyjki macicy o wielkości maksymalnej 4,5 cm, naciekającym oba sklepienia pochwy oraz przymaciczne po stronie prawe (naciek nie dochodzi do ściany miednicy)? W badaniu PET-TK stwierdzono zlewające się w pakiety węzły chłonne okołoaortalne.

- A. IIB
- B. IIIB
- C. IIIC2r
- D. IIIC1p

### Pytanie 4.

W Polsce najczęstszym nowotworem złośliwym związanym z ciążą jest:

- A. rak piersi
- B. rak szyjki macicy
- C. czerniak
- D. brak danych

### Pytanie 5.

Do najczęściej występujących nowotworów złośliwych związanych z ciążą należą:

- A. rak piersi, nowotwory hematologiczne
- B. rak jelita grubego, rak trzustki
- C. rak płuca, czerniak gałki ocznej
- D. mięsaki zaotrzewnowe

### Pytanie 6.

Który z poniższych stanów może wystąpić jako powikłanie nieleczzonego zapalenia pochwy?

- A. zapalenie narządów miednicy mniejszej
- B. niepłodność
- C. przedwczesne pęknięcie błon płodowych u ciężarnej
- D. a, b i c

### Pytanie 7.

Bakterią obecną w strukturach biofilmu przylegającego do nabłonka pochwy, odgrywającą istotną rolę w niepowodzeniach leczenia i nawrotach waginozy bakteryjnej jest:

- A. *Prevotella bivia*
- B. *Streptococcus agalactiae*
- C. *Atopobium vaginae*
- D. *Mycoplasma hominis*

### Pytanie 8.

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących chlorku dekwalinionu (DQC) jest prawdziwe?

- A. stosowanie DQC w terapii zakażeń pochwy związane jest z wysokim ryzykiem rozwoju lekooporności drobnoustrojów
- B. rekomendowanym sposobem dawkowania DQC w waginozie bakteryjnej jest dopochwowe stosowanie 10 mg przez 6 dni
- C. efekt bakteriobójczy DQC obserwowany jest po 90–120 minutach
- D. a i c

