

Pytania testowe

Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy na temat zagadnień omawianych w niniejszym numerze „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej”.

Pytanie 1.

W jakich nowotworach stosowanie metody HIPEC nie znajduje zastosowania:

- A. Śluzak otrzewnej
- B. Rak jajnika
- C. Rak trzonu macicy
- D. Rak żołądka

Pytanie 2.

Najczęściej stosowanym chemioterapeutycznym w procedurze HIPEC w leczeniu raka jajnika jest:

- A. Karboplatyna
- B. Cisplatyna
- C. Mitomycyna C
- D. Paclitaksel

Pytanie 3.

Zgodnie z zaleceniami ESMO oraz ESGO metoda HIPEC znajduje zastosowanie w leczeniu raka jajnika:

- A. W pierwszej linii leczenia
- B. W chorobie nawrotowej
- C. Zarówno w chorobie pierwotnej jak i nawrotowej
- D. Jest przeciwwskazana w leczeniu raka jajnika

Pytanie 4

Stosowanie pomiarów glikemii przy pomocy FGM (flash glucose monitoring) w porównaniu do SMBG (self-monitoring of blood glucose) jak wykazano w jednym z badań, wpływa na:

1. Rzadsze występowanie epizodów hipo- oraz hiperglikemii u pacjentki ciężarnej

2. Częstsze występowanie hipoglikemii u noworodka
3. Mniejszy odsetek przyjęć noworodków na oddział intensywnej terapii
4. Mniejszy odsetek hipoglikemii u noworodków

- A. 1, 2
- B. 1, 2, 3
- C. 1, 4
- D. 1, 3, 4

Pytanie 5

Obecnie najbardziej optymalną farmakoterapią u pacjentek z rozpoznaniem cukrzycy ciążowej jest stosowanie:

- A. Metforminy
- B. Glibenklamidu
- C. Insuliny ludzkiej
- D. Analogów insuliny

Pytanie 6

Błędym stwierdzeniem dotyczącym aktywności fizycznej u pacjentek z cukrzycą ciążową jest:

- A. Zaleca się głównie ćwiczenia aerobowe, natomiast ćwiczenia oporowe nie są przeciwwskazane.
- B. U pacjentek prowadzących uprzednio siedzący tryb życia zaleca się rozpoczęcie ćwiczeń w II trymestrze.
- C. Zaleca się stosowanie ćwiczeń 3-4 razy w tygodniu o umiarkowanej intensywności, które w skali Borga znajdują się pomiędzy 12 a 14 pkt.
- D. Pozycja, w której wykonywane są ćwiczenia w ciąży nie ma znaczenia niezależnie od trymestru.