

## Pytania testowe

Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy na temat zagadnień omawianych w niniejszym numerze „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej”.

### Pytanie 1.

Według badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia liczba przypadków operacji cesarskiego cięcia na całym świecie stale rośnie. Obecnie szacuje się ponad:

- A. 5% wszystkich porodów
- B. 20% wszystkich porodów
- C. 40% wszystkich porodów
- D. 50% wszystkich porodów

### Pytanie 2.

Terapię pracy z blizną można rozpocząć:

- A. Rok po porodzie
- B. Minimum po 6 miesiącach od porodu
- C. Podczas połoгу
- D. Nie powinno się stosować terapii blizny

### Pytanie 3.

Jakie metody terapii blizny należy stosować w szpitalu?

- A. Wietrzenie, wczesna pionizacja, regularna kontrola rany
- B. Uciskanie rany
- C. Przemywanie wodą utlenioną
- D. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

### Pytanie 4.

Wybierz twierdzenie prawdziwe dotyczące zespołu hiperstymulacji jajników:

- A. Powikłania typu niewydolność nerek, choroba zakrzepowozatorowa, krwotok z pękniętego jajnika, zespół niewydolności oddechowej są bardzo częstymi powikłaniami zespołu
- B. Postać ciężka OHSS występuje z częstością 20–33% cykli technik wspomaganego rozrodu
- C. Głównymi czynnikami uczestniczącymi w patogenezie zespołu są cytokiny i czynniki wzrostu
- D. Przeciek kapilarny prowadzący do głównych objawów OHSS jest wywołany niewydolnością prawokomorową serca

### Pytanie 5.

Ciężki zespół hiperstymulacji jajników rozpoznaje się na podstawie:

- A. Objawowego wodobrzusza i przyrostu masy ciała
- B. Hemokoncentracji rozpoznawanej na podstawie badań laboratoryjnych
- C. Stanu hipowolemii-hiponateremii
- D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

### Pytanie 6.

Postać ciężka OHSS leczona jest:

- A. Hipotonicznymi roztworami krystaloidów
- B. Diuretykami pod okiem doświadczonych klinicystów
- C. Wlewami z heparyny niefrakcjonowanej
- D. Poprzez odbarczenie wodobrzusza jako leczenie pierwszego rzutu

### Pytanie 7.

Stosowanie prostaglandyn w stanie po cięciu cesarskim jest zalecane:

- A. Zarówno w polskich, jak i niemieckich rekomendacjach
- B. Tylko w rekomendacjach PTGiP
- C. Tylko w rekomendacjach DGGG, jako metoda niskiego ryzyka
- D. Stosowanie prostaglandyn jest zabronione w stanie po cięciu cesarskim

### Pytanie 8.

Indukcja porodu w przypadku położenia miednicowego płodu jest dopuszczalna:

- A. Tylko w rekomendacjach PTGiP
- B. Tylko w rekomendacjach DGGG, w wyselekcjonowanej grupie ciężarnych
- C. Zarówno w polskich, jak i niemieckich rekomendacjach
- D. Położenie miednicowe płodu jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do indukcji porodu w rekomendacjach obu towarzystw

### Pytanie 9.

Przebyte operacje na trzonie macicy są przeciwwskazaniem do indukcji porodu

- A. Zarówno w polskich, jak i niemieckich rekomendacjach
- B. Tylko w rekomendacjach PTGiP
- C. Tylko w rekomendacjach DGGG
- D. Przebyte operacje na trzonie macicy są zawsze przeciwwskazaniem do indukcji porodu

### Pytanie 10.

Jak zmienia się zapotrzebowanie żywieniowe matki karmiącej w pierwszym półroczu?

- A. Zwiększa się o 360 kcal
- B. Zwiększa się o 500 kcal
- C. Nie zmienia się
- D. Zwiększa się o 200 kcal

### Pytanie 11.

Które ryby są polecane w ciąży ze względu na najmniejszą zawartość rtęci?

- A. Marlin, miecznik, śledź
- B. Rekin, tuńczyk, okoń
- C. Śledź, makrela, łosoś
- D. Węgorz, płoc, dorsz

### Pytanie 12.

Które produkty są niezalecane w ciąży ze względu na ryzyko zakażenia kamylobakteriozą?

- A. Produkty wędzone
- B. Surowe jaja, desery, lody na bazie jaj, surowe kiełki
- C. Sery pleśniowe, sery feta, owoce morza, sushi, ceviche
- D. Produkty z glutaminianem sodu, wątróbka

Prawidłowe odpowiedzi: 1B, 2C, 3A, 4C, 5D, 6B, 7C, 8A, 9B, 10B, 11C, 12C

