

Pytania testowe

Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy na temat zagadnień omawianych w niniejszym numerze „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej”.

Pytanie 1.

Odsetek wad wrodzonych wynikających z niewłaściwego przyjmowania leków w trakcie ciąży wynosi:

- A. 0,5–1%
- B. 2–3%
- C. 4–5%
- D. 10%

Pytanie 2.

Najczęstsza choroba przewlekła wśród młodych matek to:

- A. Przewlekła choroba tarczycy
- B. Przewlekła niewydolność nerek
- C. Przewlekła niewydolność krążeniowo-oddechowa
- D. Cukrzyca

Pytanie 3.

W 2021 roku średnia wieku, w jakim kobiety po raz pierwszy zachodzą w ciążę w Unii Europejskiej wynosiła:

- A. 24,8 lat
- B. 29,7 lat
- C. 31,4 lata
- D. 33,6 lat

Pytanie 4.

W celu uzyskania silniejszej odpowiedzi u kobiet ciężarnych na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 należy przyjąć co najmniej:

- A. 1 dawkę
- B. 2 dawki
- C. 3 dawki
- D. Należy odroczyć szczepienie do momentu zakończenia ciąży i karmienia piersią

Pytanie 5.

Które rośliny mogą mieć teratogenny wpływ na rozwijający się płód ze względu na zawarte w nich zanieczyszczenia?

- A. Rumianek, koper włoski
- B. Imbir
- C. Mięta pieprzowa
- D. Wszystkie wymienione

Pytanie 6.

Według wytycznych WHO (Standards for Improving Quality of Maternal and Newborn Care in Health Facilities, 2016) do cech świadczących o wysokiej jakości opiece należy/należą:

- A. Bezpieczeństwo
- B. Skuteczność
- C. Skupienie na potrzebach pacjenta
- D. Wszystkie powyższe

Pytanie 7.

Zator płynem owodniowym:

- A. To najczęstsza okołoporodowa przyczyna śmierci
- B. Jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonu matek
- C. Nie stanowi zagrożenia dla życia pacjentki
- D. Śmiertelność tego stanu sięga 60%

Pytanie 8.

Patogenezę zatoru płynem owodniowym stanowi:

- A. Fizyczne zablokowanie światła naczyń krwionośnych przez składniki płynu owodniowego
- B. Reakcja anafilaktyczna
- C. Predyspozycja genetyczna
- D. Wszystkie wymienione

Pytanie 9.

Faza płucna zatoru płynem owodniowym (AFE):

- A. To pierwszy etap zjawisk zachodzących na skutek tej patologii
- B. Ta faza odpowiada za połowę zgonów spowodowanych AFE
- C. Dochodzi w niej do wystąpienia ostrej niewydolności lewej komory
- D. Prawidłowe A i B

Pytanie 10.

Zator płynem owodniowym należy podejrzewać:

- A. U pacjentki rodzącej
- B. U pacjentki po niedawno przeżytym porodzie
- C. U pacjentki po wykonanej amniopunkcji
- D. Wszystkie wymienione

Pytanie 11.

Kryteria rozpoznania zatoru płynem owodniowym nie uwzględniają:

- A. Ostrej hipoksji
- B. Nadciśnienia
- C. Koagulopatii
- D. Hipotensji

Pytanie 12.

Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą działania kannabinooidów wobec ektopowego endometrium

- A. Wykazują działanie proapoptyczne
- B. Wykazują działanie antyproliferacyjne
- C. Wykazują działanie hamujące neoangiogenezę i neurogenezę
- D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne

Pytanie 13.

Endometrium ektopowe w porównaniu do eutopowego wykazuje:

- A. Wzmożoną zdolność do proliferacji
- B. Wzmożoną skłonność do apoptozy
- C. Zwiększone wydzielanie endokannabinoidów
- D. Zwiększoną ekspresję receptorów kannabinoidowych

Pytanie 14.

Do elementów układu endokannabinoidowego człowieka nie należą:

- A. Receptory CB1 i CB2
- B. Receptory adrenergiczne
- C. Receptory waniloidowe, np: TRPV-1
- D. Endokannabinoidy: anandamid i 2-arachidonoilglicerol

Pytanie 15.

W badaniu obserwacyjnym opisanym w artykule konopie były przyjmowane w sposób zapewniający największą biodostępność. Metodą tą jest:

- A. Podanie doustne w formie kapsułki
- B. Palenie „konopnego papierosa”
- C. Waporyzacja
- D. Aplikacja czopków doodbytniczych

Pytanie 16.

W którym z podanych przypadków zaleca się suplementację progesteronem?

- A. Niewyselekcjonowane ciąży bliźniacze
- B. Ciąży bliźniacza i poród przedwczesny w poprzedniej ciąży
- C. Ciąży bliźniacza i krótka szyjka macicy w obecnej ciąży (< 25 mm)
- D. W żadnym z powyższych przypadków

Pytanie 17.

Z którym spośród poniższych czynników nie wiąże się zaawansowany wiek rozrodczy?:

- A. Większy odsetek cięć cesarskich
- B. Występowanie preeklampsji w aktualnej ciąży
- C. Wyższe ryzyko martwego urodzenia
- D. Większy wskaźnik uzyskanych ciąż przy zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu

Pytanie 18.

Z czym nie jest związane stosowanie technik wspomaganego rozrodu (w porównaniu do zapłodnienia naturalnego)?

- A. Z częstszym występowaniem ciąży ektopowej
- B. Z częstszym występowaniem ciąży mnogiej
- C. Ze wzrostem ryzyka występowania nieprawidłowego kariotypu u płodu
- D. Z większą częstością samoistnego porodu przedwczesnego

