

Pytania testowe

Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy na temat zagadnień omawianych w niniejszym numerze „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej”.

Pytanie 1.

Infekcja SARS-CoV-2 u kobiety ciężarnej zwiększa ryzyko wystąpienia:

- Choroby zakrzepowo-zatorowej, cukrzycy ciążowej, niewydolności cieśniowo-szyjkowej oraz hipotrofii płodu
- Choroby zakrzepowo-zatorowej, cholestazy ciążowej oraz cukrzycy ciążowej
- Niewydolności cieśniowo-szyjkowej, stanu przedrzucawkowego, cholestazy ciążowej oraz choroby zakrzepowo-zatorowej
- Stanu przedrzucawkowego, choroby zakrzepowo-zatorowej oraz hipotrofii płodu

Pytanie 2.

Do leków, które można zastosować u pacjentki ciężarnej hospitalizowanej w warunkach oddziału położniczego ze stwierdzonym łagodnym przebiegiem COVID-19 należą wszystkie poniższe, z wyjątkiem:

- Bebtelovimab
- Nirmatrelwir z rytonawirem
- Heparyny drobnocząsteczkowe
- Remdesiwir

Pytanie 3.

Szczepienie przeciw COVID-19 jest:

- Obowiązkowe dla ciężarnych wyjeżdżających poza granice kraju
- Zalecane w ciąży niezależnie od trymestru
- Refundowane dla pacjentek ciężarnych > 35. roku życia
- Zalecane i refundowane dla wszystkich ciężarnych od III. trymestru

Pytanie 4.

Która bakteria nie zalicza się do najczęstszych drobnoustrojów izolowanych z posiewu krwi matki z sepsą?

- Escherichia coli*
- Streptococcus*
- Staphylococcus*
- Enterococcus*

Pytanie 5.

Jakie najważniejsze postępowanie należy wdrożyć u pacjentki ciężarnej w pierwszej godzinie od podejrzenia sepsy?

- Pobranie krwi oraz sprawdzenie stężenia mleczanów
- Podanie antybiotyku o szerokim spektrum działania
- Wdrożenie wczesnego żywienia doustnego
- Podanie krystaloidu dożylnie (do 30 ml/kg m.c.)

Pytanie 6.

Które z niżej wymienionych nie jest kryterium rozpoznania sepsy:

- Hipoglikemia
- Częstość oddechów $\geq 22/\text{min}$
- Zaburzenie świadomości
- Ciśnienie skurczowe krwi $\leq 100 \text{ mm Hg}$

Pytanie 7.

Jakiego rodzaju zakażenia/zapalenia należą do rzadkich przyczyn sepsy w ciąży?

- Zakażenia przewodu pokarmowego i zakażenia skóry i tkanek miękkich
- Zakażenia dróg rodnych i zakażenia dróg moczowych
- Zakażenia układu oddechowego i zapalenie gruczołu piersiowego
- Zakażenia układu oddechowego i zakażenia dróg moczowych

Pytanie 8.

W jakim celu stosuje się skalę MOEWS?

- W celu oceny zaawansowania sepsy w położnictwie
- W celu wykrycia wczesnych objawów choroby oraz uruchomienia procedur w odpowiednim czasie
- W celu wyodrębnienia ciężarnych w ciężkich stanie choroby i zakwalifikowanie ich do leczenia na Oddziale Intensywnej Terapii
- W celu oceny rokowania sepsy w położnictwie

Pytanie 9.

Które z poniższych NIE stanowi wskazania do włączenia terapii farmakologicznej endometriozy?

- Dolegliwości bólowe w miednicy mniejszej
- Uzupełnienie leczenia chirurgicznego endometriozy
- Endometrioza rozpoznana przed planowaną ciążą
- Dypareunia

Pytanie 10.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące analogów GnRH:

- Ich jednym z głównych działań ubocznych są objawy androgenizacji
- Antagoniści GnRH powodują mniejszą utratę kostną w stosunku do agonistów GnRH
- Agoniści GnRH powodują mniejszą utratę kostną w stosunku do antagonistów GnRH
- Celem uzyskania optymalnego efektu terapeutycznego stosowane są przez 6–12 miesięcy

Pytanie 11.

Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące dienogestu:

- Nie powoduje zmniejszenia gęstości mineralnej kości
- Przy jego stosowaniu stężenie estradiolu utrzymuje się na poziomie pierwszej fazy cyklu, co zapobiega objawom wypadowym
- Najniższe stężenia estrogenów obserwuje się przy stosowaniu powyżej 6 miesięcy
- Optymalna dawka dobową to 2 mg

Pytanie 12.

Który z poniższych objawów ubocznych NIE wiąże się ze stosowaniem progestagenów?

- Nadżerki i owrzodzenia żołądka
- Zaburzenia profilu lipidowego
- Nieregularne krwawienia z dróg rodnych
- Bóle głowy

Pytanie 13.

Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie odnośnie działania progestagenów w endometriozie:

- A. Zmniejszają dolegliwości bólowe okołomiesiączkowe oraz przy współżyciu
- B. Redukują ilość ognisk endometrialnych
- C. Wywołują stan hipiestrogenizmu dzięki wysokiemu powinowactwu do receptora estrogenowego
- D. Wkładka wewnątrzmaciczna z lewonorgestrel jest korzystna w endometriozie głęboko naciekającej okolicy rektowaginalnej

Pytanie 14.

Który z poniższych należy do progestagenów?

- A. Relugolix
- B. Danazol
- C. Desogestrel
- D. Goserelina

Pytanie 15.

Za zmiany zachodzące w układzie krążenia kobiet ciężarnych odpowiada przede wszystkim:

- A. Progesteron
- B. Estrogen
- C. Gonadotropina kosmówkowa
- D. A i B

Pytanie 16.

Do zmian adaptacyjnych zachodzących w układzie krążenia kobiety ciężarnej nie należy:

- A. Przyspieszenie czynności rytmu serca
- B. Zwiększenie objętości krwi krążącej
- C. Zwiększenie objętości wyrzutowej i minutowej serca
- D. Zwiększenie całkowitego oporu naczyniowego krążenia systemowego i naczyń płucnych

Pytanie 17.

Podwyższone wartości peptydu natriuretycznego NT-proBNP odnotowuje się w przypadku wystąpienia:

- A. Nadciśnienia tętniczego, stanu przedzucawkowego
- B. Cukrzycy
- C. A i B
- D. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Odpowiedzi: 1D, 2A, 3B, 4D, 5B, 6A, 7C, 8B, 9C, 10B, 11C, 12A, 13C, 14C, 15D, 16D, 17A