

Pytania testowe

Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy obejmującej zagadnienia, o których jest mowa w niniejszym numerze „Hematologii”.

Pytanie 1.

Proszę wskazać prawidłowe stwierdzenie

- A. U nosicieli hemofilii B aktywność czynnika IX w czasie ciąży zwiększa się znacząco
- B. Stosowanie leków antyfibrynolitycznych w ciąży jest bezwzględnie przeciwwskazane
- C. Jako przygotowanie do porodu ciężarnej nosicielki hemofilii B z aktywnością czynnika IX 20 jm./dl można zastosować desmopresynę
- D. W ciągu 3–7 dni od rozpoczęcia podawania desmopresyny dochodzi do wyczerpania magazynów śródbłonkowych czynnika VIII, w związku z czym dłuższe stosowanie desmopresyny jest nieskuteczne
- E. Podejrzenie hemofilii u płodu jest przeciwwskazaniem do porodu naturalnego

Pytanie 2.

U krwawiącej z dróg rodnych ciężarnej nosicielki hemofilii A z aktywnością czynnika VIII wynoszącą 20%: 1) należy wykluczyć ginekologiczne przyczyny krwawienia; 2) leczeniem z wyboru są osoczopochodne koncentraty czynnika VIII, gdyż koncentraty rekombinowane nie mają przewagi nad koncentratami osoczopochodnymi; 3) dożylny wstrzyknięcie koncentratu czynnika VIII w dawce 1 jm./kg mc. spowoduje wzrost aktywności czynnika VIII w osoczu o ok. 2 jm./dl; 4) aktywność czynnika VIII należy utrzymywać powyżej 50 jm./dl; 5) leczenie substytucyjne kontynuuje się do czasu porodu; 6) laboratoryjne monitorowanie leczenia polega na codziennym pomiarze aktywności czynnika VIII w próbce krwi pobranej około 1 h po wstrzyknięciu koncentratu czynnika VIII. Prawidłowe są stwierdzenia:

- A. 1,3,6
- B. 2,4,5
- C. 1,3,4
- D. 1,5,6
- E. 3,4,6

Pytanie 3.

Proszę wskazać prawidłowe stwierdzenie:

- A. Czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na czas przeżycia chorych na amyloidozę AL jest wielkość nacieczenia plazmocytowego szpiku przed leczeniem, natomiast liczba zajętych procesem chorobowym narządów nie ma istotnego znaczenia
- B. Zmiany niedokrwienne serca w zapisie EKG są bardzo typowe dla amyloidozy serca
- C. Standardowym i korzystnym u znacznej części chorych leczeniem amyloidozy AL jest wysokodawkowana chemioterapia z następnym przeszczepieniem autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych pod warunkiem prawidłowej kwalifikacji tych chorych
- D. Zrąb amyloidu w amyloidozie AL stanowią, pozostające w stanie rozpuszczalnym, immunoglobulinowe łańcuchy lekkie po modyfikacji ich N-końcowego fragmentu
- E. Skuteczną metodą leczenia zlokalizowanych guzów amyloidowych (*amyloidoma*) jest wyłącznie leczenie systemowe (chemioterapia, kortykosteroidy), gdyż prowadzi do całkowitego ustąpienia zmian, bez konieczności stosowania leczenia miejscowego (resekcja czy napromieniowanie guza)

Pytanie 4.

Do kryteriów rozpoznania zespołu mielodysplastycznego z izolowaną delecją chromosomu 5q– zalicza się: 1) zmniejszoną liczbę megakariocytów z jądrami o zmniejszonej liczbie płatów w szpiku; 2) niedokrwistość; 3) trombocytopenię; 4) < 5% blastów w rozmazie krwi obwodowej; 5) obecność pałek Auera. Prawidłowe jest stwierdzenie/są stwierdzenia:

- A. 2)
- B. 1), 2), 3)
- C. 1), 2), 3), 4), 5)
- D. 2), 4), 5)
- E. 2), 4)

Pytanie 5.

Do czynników wpływających na rozwój kolejnych nowotworów u pacjentów z rozpoznaniem szpiczakiem plazmocytowym należą: 1) przebyte leczenie; 2) czynniki behawioralne; 3) wiek; 4) czynniki genetyczne; 5) choroby współistniejące. Prawidłowe są stwierdzenia:

- A. 1), 3)
- B. 1), 2), 3), 4), 5)
- C. 4), 5)
- D. 2), 4), 5)
- E. 2), 3), 4)

Pytanie 6.

Do leków chelatujących dostępnych w formie doustnej należą: 1) deferoksamina; 2) deferazyroks; 3) deferypron. Prawidłowe jest stwierdzenie/są stwierdzenia:

- A. 1)
- B. 2)
- C. 3)
- D. 1) 2)
- E. 1), 2), 3)

Pytanie 7.

Przetoczenie 100 j koncentratów krwinek czerwonych dostarcza około:

- A. 20 mg żelaza
- B. 200 mg żelaza
- C. 2 g żelaza
- D. 20 g żelaza
- E. 200 g żelaza

Pytanie 8.

Przeładowanie żelazem może wystąpić u chorych z następującymi schorzeniami: 1) anemią sierpowatokrwinkową; 2) talasemią; 3) anemią aplastyczną. Prawidłowe jest stwierdzenie/są stwierdzenia:

- A. 1)
- B. 2)
- C. 3)
- D. 1), 2)
- E. 1), 2), 3)

Prawidłowe odpowiedzi:
1D, 2C, 3C, 4E, 5B, 6D, 7D, 8E