Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy obejmującej zagadnienia, o których jest mowa w niniejszym numerze „Hematologii”.

Pytanie 1.

Leczenie hiponatremii w zespole nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH, *syndrome of inappropriate antidiuretic hormone*) polega na:

- A. Podawaniu 10-procentowych roztworów chlorku sodu
- B. Uzupełnianiu sodu fizjologicznymi roztworami chlorku sodu
- C. Uzupełnianiu sodu 3-procentowymi roztworami chlorku sodu
- D. Podawaniu wodorowęglanów sodu
- E. Ograniczeniu podaży płynów do 500–1000 ml/dobę

Pytanie 2.

Do kryteriów rozpoznania zespołu lizy guza nie należy/nie należą:

- A. Stężenie kwasu moczowego co najmniej 8 mg/dl (lub wzrost o 25%)
- B. Zaburzenia rytmu serca, hipotensja, niewydolność serca
- C. Stężenie wapnia co najmniej 10,5 mg/dl (lub wzrost o 25%)
- D. Drgawki lub cechy nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej
- E. Stężenie potasu co najmniej 6,0 mmol/l (lub wzrost o 25%)

Pytanie 3.

Najczęściej występującym zaburzeniem równowagi kwasowo-zasadowej u pacjentów z chorobami nowotworowymi jest:

- A. Zasadowica oddechowa
- B. Kwasica oddechowa
- C. Zasadowica metaboliczna
- D. Kwasica metaboliczna
- E. Prawidłowe odpowiedzi to B i D

Pytanie 4.

Które z poniższych stwierdzeń dotyczące chłoniaka z o wysokiej złośliwości z komórek B z rearanżacjami *MYC* i *BCL2* i/lub *BCL6* (*high grade B-cell lymphoma with MYC and BCL2 and/or BCL6 rearrangements*) jest prawdziwe?

- A. Może być rozpoznany, jeżeli wykazuje silną ekspresję białek *MYC* i *BCL2* w barwieniach immunohistochemicznych
- B. Jest nazywany chłoniakiem “*double/triple hit*”
- C. Obejmuje jedynie przypadki o morfologii nieprzypominającej chłoniaka rozlanego z dużych komórek B
- D. Wymaga dostępności świeżej tkanki do badań cytogenetycznych
- E. Wykazuje nieprawidłowości w obrębie chromosomu 11q

Pytanie 5.

Zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, *World Health Organization*) z 2017 roku rozpoznanie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B będzie wymagało określenia:

- A. Typu GCB w porównaniu z *non*-GCB/ABC
- B. Wskaźnika proliferacyjnego MIB1/Ki-67
- C. Oceny mutacji genów *MYC* i *BCL2*
- D. Oceny ekspresji CD30
- E. Oceny profilu ekspresji genów

Pytanie 6.

Zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi w pierwszej linii leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej *Philadelphia*-dodatkowo u chorego można włączyć:

- A. Nilotynib
- B. Imatynib
- C. Dasatynib
- D. Bosutynib
- E. Imatynib lub dasatynib

Pytanie 7.

Właściwym postępowaniem w przypadku wystąpienia płynu w jamie opłucnej jako powikłania leczenia dazatynibem jest:

- A. Trwałe zaprzestanie leczenia tym lekiem
- B. Utrzymanie leczenia tym lekiem, ale w mniejszej dawce
- C. Czasowe zaprzestanie leczenia tym lekiem, podanie leku moczopędnego, ewentualnie podanie kortykosterydu i nakłucie opłucnej
- D. Utrzymanie leczenia tym lekiem, podanie leku moczopędnego i kortykosteroidu
- E. Utrzymanie leczenia tym lekiem, nakłucie opłucnej

Pytanie 8.

Ostra białaczka limfoblastyczna z obecnością chromosomu *Philadelphia* w populacji chorych dorosłych występuje u:

- A. 50% chorych
- B. 25% chorych
- C. 10% chorych
- D. Mniej niż 5% chorych
- E. 80% chorych

Pytanie 9.

Zjawisko polegające na aktywacji tego samego klonu limfocytów T w obecności przynajmniej dwóch różnych par układ ludzkich antygenów leukocytarnych (HLA, *human leukocyte antigens*)–peptyd nosi miano:

- A. Selekcji klonalnej
- B. Immunodominacji
- C. Alloreaktywności
- D. Restrykcji kompleksów głównego układu zgodności tkankowej (MHC, *major histocompatibility complex*)
- E. Powinowactwa

Pytanie 10.

Do wystąpienia alloreaktywnej odpowiedzi komórek naturalnej cytotoksyczności (NK, *natural killers*) niezbędna jest sygnalizacja wywodząca się z:

- A. Receptorów aktywujących, które ulegają indukcji tylko w kontakcie z antygenami prezentowanymi na komórkach nowotworowych i zakażonych wirusem
- B. Receptorów hamujących, które ulegają indukcji tylko w kontakcie z antygenami prezentowanymi na komórkach nowotworowych i zakażonych wirusem
- C. Receptorów hamujących, które ulegają indukcji tylko w kontakcie z antygenami selfu
- D. Receptorów aktywujących, które ulegają indukcji tylko w kontakcie z antygenami selfu
- E. Receptorów KIR (*killer-cell immunoglobulin-like receptors*)

Poprawne odpowiedzi:
1E, 2C, 3D, 4B, 5A, 6B, 7C, 8B, 9C, 10A