

## Bożena Mrugała-Przybyła

Szpital Powiatowy w Zawierciu

## Przypadek kliniczny 10

## Opis przypadku pacjenta z nadciśnieniem tętniczym

*Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2015, tom 1, nr 2, strony: 131***Wstęp**

Pacjent lat 65, mężczyzna, zgłosił się do poradni z okresowymi bólami głowy, ogólnym osłabieniem i zawrotami głowy. Chory był od 2007 roku leczony na nadciśnienie tętnicze, regularnie korzystał z opieki lekarskiej. Nie prowadzi systematycznej samokontroli pomiarów ciśnienia tętniczego (BP, *blood pressure*), podwyższone wartości BP utrzymują się, według pacjenta, od 4 tygodni w granicach 170/100 mm Hg.

**Wywiad rodzinny:** pacjent jest obciążony rodzinie nadciśnieniem tętniczym (matka).

**Badanie przedmiotowe**

- BP 170/100 mm Hg;
- ASM 76/min.

**Badania laboratoryjne**

- morfologia: hemoglobina 15,0 g/dl, hematokryt 44,6%, liczba erytrocytów 45,33, liczba leukocy-

tów 6,8, liczba płytek 145 tys., potas 4,05 mmol/l, sód 139,8 mmol/l, glukoza na czczo 84 mg/dl, bilirubina całkowita 2,06 mg/dl, AST 47 U/L, ALT 24 U/l.

- lipidogram — cholesterol całkowity 280, stężenie triglicerydów 176, cholesterol frakcji HDL (*high density lipoprotein* — lipoproteiny o dużej gęstości) 40, cholesterol frakcji LDL (*low density lipoprotein* — lipoproteiny o małej gęstości) 140.

**Komentarz**

Leczenie nadciśnienia zostało zmodyfikowane — wprowadzono Triplixam w dawce 5/1,25/5, zastosowano leczenie statynami. Wprowadzenie leczenia preparatem złożonym Triplixam dało pozytywny efekt terapeutyczny — wartości BP ustabilizowały się na poziomie 120/85 mm Hg.

Adres do korespondencji: dr n. med. Bożena Mrugała-Przybyła, kardiolog  
Szpital Powiatowy w Zawierciu  
Oddział Wewnętrzny  
e-mail: bozena.m.p@onet.pl



Copyright © 2015 Via Medica, ISSN 1428-5851