

## List do Redakcji • Letter to the Editor

## Polska nadal „Kopciuskiem” Europy

## Poland is still remaining at the bottom of EUROCARE survival rates

Szanowny Panie Redaktorze,

Jako pionier badań nad przeżyciami chorych na nowotwory złośliwe w populacji Polski i jeden z założycieli „Eurocare-1” czuję się w obowiązku przekazać Pana czytelnikom fragmenty wyników „Eurocare-3” ujawnione przez Michela Colemana na The European Cancer Conference w Kopenhadze 25 września 2003 r. Badanie Eurocare-3 objęło populację 1,8 mln chorych na nowotwory złośliwe, którzy zachorowali w latach 1990-94 w 22 krajach naszego Kontynentu. Przeciętna europejska przeżyć 5-letnich w powyższych krajach wynosiła 40% u mężczyzn i 47% u kobiet.

Najwyższe przeżycia zaobserwowano w Austrii, Francji i Szwajcarii, a najniższe na Słowacji, w Estonii i Polsce (Tabela I). Również przeżycia polskich chorych na raka jelita grubego, piersi, jądra i czerniaka należały do najniższych w Europie.

Pozwoliłem sobie porównać wyniki tych badań z wynikami Eurocare-2, w których jeszcze brałem osobiście udział (Tabela II).

Niewątpliwie w latach 1990-94, w porównaniu z okresem 1985-89, szanse przeżycia 5 lat polskich chorych na nowotwory złośliwe wzrosły, ale tempo wzrostu (choć jest niemal takie samo, jak w Krajach Unii Europejskiej) nie

Tab. I. Przeżycia 5-letnie chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe (1990-1994)

	Polska	Unia Europejska
Jelito grube	28%	50%
Czerniak	60%	82%
Jądro	82%	90%
Pierś	62%	75%
Ogółem:		
M (1. Austria)	25%	40%
K (2. Francja)	40%	56%

Pojęcie (1. Austria) i (2. Francja) wskazują na I i II pozycję odnośnie przeżyć, tj. kraje o najlepszych przeżyciach.

pozwoło nam na dogonienie krajów skandynawskich i Europy Zachodniej.

Mam nadzieję, że moi następcy, biorący udział w „Eurocare-3”, przedstawią szerzej ten problem.

**Prof. dr hab. med. Janusz Pawłega**  
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii  
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  
ul. Kopernika 19  
31-501 Kraków

Tab. II. Przeżycia 5-letnie chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe w dwóch okresach czasu

Polska	1985-1989	1990-1994	Zmiana w % 1990-1994 / 1985-1989
Jelito grube	24%	28%	+ 4%
Czerniak	55%	60%	+ 5%
Jądro	79%	82%	+ 3%
Pierś	58%	62%	+ 4%
Ogółem:			
Mężczyźni	19%	25%	+ 6%
Kobiety	33%	40%	+ 7%

  

Unia Europejska	1985-1989	1990-1994	Zmiana w % 1990-1994 / 1985-1989
Jelito grube	48%	50%	+ 2%
Czerniak	77%	82%	+ 5%
Jądro	89%	90%	+ 1%
Pierś	72%	75%	+ 3%
Ogółem:			
Mężczyźni	35%	40%	+ 5%
Kobiety	47%	56%	+ 9%