

lek. Zuzanna Synowiec

Klinika Onkologii, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przypadek 2**Parametry wyjściowe**

Stopień zaawansowania (TNM)	pT3NxM0
Typ histologiczny	Jasnokomórkowy
Stopień złośliwości (G) według Fuhrman	G1
Czas od rozpoznania do uogólnienia/nawrotu (mies.)	125 (luty 2003 r. — nefrektomia lewostronna; lipiec 2013 r. — wznowa miejscowa oraz przerzuty w trzustce w kontrolnym badaniu CT)
Kategoria rokownicza według MSKCC w momencie kwalifikacji do leczenia systemowego	Korzystna

CT (*computed tomography*) — tomografia komputerowa; G (*grade*) — stopień; MSKCC — *Memorial Sloan Kettering Cancer Center*; TNM (*tumor, nodus, metastases*) — klasyfikacja guz, węzeł, przerzuty

Pierwsza linia leczenia

Lek	Sunitynib
Dawka	50 mg dziennie, schemat 4/2, bez modyfikacji dawki
Stan sprawności w chwili kwalifikacji do leczenia (ECOG)	0
Lokalizacja ognisk nowotworowych	Wznowa miejscowa Trzustka (5 zmian przerzutowych)
Czas leczenia (mies.)	9
Najlepsza odpowiedź według RECIST CR/PR/SD/PD	PR (po 4 cyklach leczenia)
Działania niepożądane (G3/4)	Nie występowały
Pozostałe działania niepożądane	Wystąpienie działań niepożądanych: niedoczynność tarczycy, wzrost ciśnienia tętniczego, zespół ręka–stopa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; stosowano leczenie wspomagające
Przyczyna zakończenia leczenia	Progresja, nowe zmiany przerzutowe w wątrobie w badaniu CT (liczne drobne)

CR (*complete response*) — odpowiedź całkowita; CT (*computed tomography*) — tomografia komputerowa; ECOG — *Eastern Cooperative Oncology Group*; G (*grade*) — stopień; PD (*progression of disease*) — progresja choroby; PR (*partial response*) — odpowiedź częściowa; RECIST — *Response Evaluation Criteria In Solid Tumors*; SD (*stable disease*) — stabilizacja choroby

Druga linia leczenia

Lek	Aksytynib
Dawka	2 × 5 mg dziennie
Stan sprawności w chwili kwalifikacji do leczenia (ECOG)	0
Lokalizacja ognisk nowotworowych	Wątroba: liczne drobne zmiany przerzutowe Wznowa miejscowa Trzustka (3 zmiany przerzutowe)
Czas leczenia (mies.)	13
Najlepsza odpowiedź według RECIST CR/PR/SD/PD	PR (po 12 cyklach leczenia)
Działania niepożądane (G3/4)	Dwukrotnie zawał serca (maj/czerwiec 2015 r.)
Pozostałe działania niepożądane	Niedoczynność tarczycy, wahania ciśnienia tętniczego, zespół ręka–stopa, biegunka
Przyczyna zakończenia leczenia	Kardiotoksyczność

CR (*complete response*) — odpowiedź całkowita; CT (*computed tomography*) — tomografia komputerowa; ECOG — *Eastern Cooperative Oncology Group*; G (*grade*) — stopień; PD (*progression of disease*) — progresja choroby; PR (*partial response*) — odpowiedź częściowa; RECIST — *Response Evaluation Criteria In Solid Tumors*; SD (*stable disease*) — stabilizacja choroby