

**dr n. med. Agnieszka Maria Karpińska**

Oddział Onkologii Klinicznej, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

**Przypadek 3****Parametry wyjściowe**

Stopień zaawansowania (TNM)	pT2aNxM1
Typ histologiczny	Jasnokomórkowy
Stopień złośliwości (G) według Fuhrman	G2
Czas od rozpoznania do uogólnienia/nawrotu (mies.)	3
Kategoria rokownicza według MSKCC w momencie kwalifikacji do leczenia systemowego	Pośrednia

G (grade) — stopień; MSKCC — Memorial Sloan Kettering Cancer Center; TNM (tumor, nodus, metastases) — klasyfikacja guz, węzół, przerzuty

**Pierwsza linia leczenia**

Lek	Interferon $\alpha$
Dawka	9 mln IU 3 × w tygodniu
Stan sprawności w chwili kwalifikacji do leczenia (ECOG)	0
Lokalizacja ognisk nowotworowych	Zmiany przerzutowe w płucach widoczne w CT, w obu płucach rozsiane guzki, największy w płucu prawym, o średnicy 0,8 cm Zmiana przerzutowa w lewym nadnerczu o wymiarach 4,8 × 3,8 × 3,6 cm
Czas leczenia (mies.)	3
Najlepsza odpowiedź według RECIST CR/PR/SD/PD	PD
Działania niepożądane (G3/4)	Nie występowały
Przyczyna zakończenia leczenia	Progresja w nadnerczu

CR (complete response) — odpowiedź całkowita; CT (computed tomography) — tomografia komputerowa; ECOG — Eastern Cooperative Oncology Group; G (grade) — stopień; PD (progression of disease) — progresja choroby; PR (partial response) — odpowiedź częściowa; RECIST — Response Evaluation Criteria In Solid Tumors; SD (stable disease) — stabilizacja choroby

**Druga linia leczenia**

Lek	Aksytynib
Dawka	2 × 5 mg dziennie
Stan sprawności w chwili kwalifikacji do leczenia (ECOG)	0
Lokalizacja ognisk nowotworowych	Zmiany przerzutowe w płucach, największe w segmencie 3 w prawym płucu o wielkości 0,8 cm, obraz stabilny w stosunku do poprzedniego badania CT Zmiana przerzutowa w lewym nadnerczu o wymiarach 5,0 × 6,1 × 4,2 cm
Czas leczenia (mies.)	> 13 (leczenie jest kontynuowane)
Najlepsza odpowiedź według RECIST CR/PR/SD/PD	PR
Działania niepożądane (G3/4)	Biegunka
Pozostałe działania niepożądane	Nadciśnienie tętnicze, osłabienie, chrypka
Modyfikacja dawkowania	W 3. cyklu zwiększono dawkę aksytynibu do 2 × 7 mg dziennie. Z powodu biegunki (7–8 luźnych stolców/d.), nadciśnienia tętniczego (200/100 mm Hg) zredukowano dawkę aksytynibu do 2 × 5 mg

CR (complete response) — odpowiedź całkowita; CT (computed tomography) — tomografia komputerowa; ECOG — Eastern Cooperative Oncology Group; G (grade) — stopień; PD (progression of disease) — progresja choroby; PR (partial response) — odpowiedź częściowa; RECIST — Response Evaluation Criteria In Solid Tumors; SD (stable disease) — stabilizacja choroby