

Supplementary material

Tokarek T, Homaj M, Zabojszcz M, et al. Knowledge on the guideline-recommended use of antiplatelet and anticoagulant therapy during dental extractions: a contemporary survey among Polish dentists. Kardiol Pol. 2020; 78: 1122-1128. doi:10.33963/KP.15588

Please note that the journal is not responsible for the scientific accuracy or functionality of any supplementary material submitted by the authors. Any queries (except missing content) should be directed to the corresponding author of the article.

Kwestionariusz – badanie

Zmienne:

Dane podstawowe

Liczba lat praktyki stomatologicznej (bez stażu podyplomowego)

Do 5 lat

5-15 lat

Powyżej 15 lat

Czy jesteś lekarzem specjalistą?

NIE

TAK

Jeśli TAK to:

Ortodonta

Chirurg stomatolog

Chirurg szczękowo-twarzowy

Stomatolog zachowawczy z endodoncją

Stomatolog dziecięcy

Periodontolog

Protetyk

Główna część twojej działalności leczniczej jest związana z:

Własną prywatną praktyką

Prywatną praktyką w ramach NZOZ

Praktyką na rzecz NFZ

Ankieta merytoryczna

1. Czy u pacjenta, który zgłosił się do planowej ekstrakcji zęba i zażywa leki przeciwkrzepliwe (Acenokumarol lub Warfaryna) wymagasz by miał ze sobą aktualny wynik wskaźnika INR przed ekstrakcją?

TAK

NIE

2. Wynik wskaźnika INR z jakiego czasu przed ekstrakcją akceptujesz jako aktualny?

Do 24 godzin

Do 48 godzin

Do 5 dni

Do 7 dni

3. Czy usuniesz ząb ze wskazaniami do ekstrakcji jeśli aktualny INR pacjenta mieści się w zakresie terapeutycznym pomiędzy 2-4?

Tak

Tak, ale zalecę pacjentowi pominięcie dawki/dawek leku przeciwkrzepliwego

Nie, skieruję do innego stomatologa (chirurga)

Nie, skieruję do kardiologa/internisty w celu przygotowania do zabiegu

4. Czy wymagasz oznaczenia wskaźnika INR przed ekstrakcją u pacjentów zażywających nowoczesne leczenie przeciwkrzepliwe (Pradaxa®, Xarelto®)?

TAK

NIE

5. Czy usuniesz ząb ze wskazaniami do ekstrakcji jeśli pacjent zażywa nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxa®, Xarelto®)?

Tak

Tak, ale zalecę pacjentowi pominięcie dawki/dawek leku

Nie, skieruję do innego stomatologa (chirurga)

Nie, skieruję do kardiologa/internisty w celu przygotowania do zabiegu

6. Czy stosujesz profilaktykę (antybiotykoterapię) Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia (IZW) u pacjenta stomatologicznego z:

- | | |
|---|---------|
| a) Po przebytych w przeszłości IZW | TAK/NIE |
| b) Ze sztuczną zastawką serca | TAK/NIE |
| c) Z biologiczną zastawką serca | TAK/NIE |
| d) Z rozrusznikiem serca | TAK/NIE |
| e) Z wszczepionym stentem wieńcowym | TAK/NIE |
| f) Z wrodzoną wadą siniczą serca | TAK/NIE |
| g) Z cukrzycą | TAK/NIE |
| h) Z wadą zastawki serca – dotychczas nie leczoną zabiegowo | TAK/NIE |
| i) Po przebytych zawałach serca w przeszłości | TAK/NIE |

7. Czy usuniesz ząb ze wskazaniami do ekstrakcji jeśli pacjent aktualnie zażywa kwas acetylosalicylowy (ASA)?

Tak

Tak, ale polecę pacjentowi odstawienie ASA przed zabiegiem

Nie, odeślę pacjenta do kardiologa/internisty w celu przygotowania do zabiegu

8. Czy usuniesz ząb ze wskazaniami do ekstrakcji jeśli pacjent aktualnie zażywa tzw. podwójne leczenie przeciwplatekcyjne - kwas acetylosalicylowy (ASA) i kłopidogrel (Plavix®) lub tikagrelor (Brilique®)

Tak

Tak, ale polecę pacjentowi odstawienie obu leków przed zabiegiem

Tak, ale po odstawieniu jednego z dwóch leków

Nie, odeślę pacjenta do kardiologa/internisty celem przygotowania do zabiegu

9. Jaki odsetek pacjentów w twojej praktyce stomatologicznej stanowią chorzy zażywający

- | | |
|---------------------------|--------|
| a) Leki przeciwkrzepliwe | _____% |
| b) Kwas acetylosalicylowy | _____% |

c) Podwójną terapię przeciwplątkową_____%

Questionnaire – survey [English version of the original Polish questionnaire]

Variables

Baseline data

Years of clinical practice as a dentist (excluding postgraduate internship)

Up to 5 years

5-15 years

Over 15 years

Are you board certified?

NO

YES

If YES:

Orthodontist

Dental surgeon

Maxillofacial surgeon

Conservative dentist with endodontics

Children's dentist

periodontist

prosthodontist

Major part of your clinical practice is associated with:

Your own private practice

Private practice under owner

Public dental practice

Medical part

1. Do you require a patient who has scheduled elective tooth extraction and is taking anticoagulants (Acenocoumarol or Warfarin) to have the current INR result before extraction?

YES

NO

2. INR result from what time before extraction do you accept as current?

Up to 24 hrs

Up to 48 hrs

Up to 5 days

Up to 7 days

3. Will you remove a tooth with extraction indications if the patient's current INR is within the therapeutic range between 2-4?

Yes

Yes, but I will recommend omission of 1 dose

No, I will recommend another dentist (surgeon)

No, I will recommend consultation by cardiologist/internist first

4. Do you require an INR indicator before extraction in patients receiving modern anticoagulation (Pradaxa®, Xarelto®)?

YES

NO

5. Will you remove the tooth with extraction indications if you are taking new anticoagulants (Pradaxa®, Xarelto®)?

Yes

Yes, but I will recommend omission of 1 dose

No, I will recommend another dentist (surgeon)

No, I will recommend consultation by cardiologist/internist first

6. Do you use prophylaxis (antibiotic therapy) for Infective Endocarditis (IE) on a dental patient with:

j) Prior IE	YES/NO
k) Artificial heart valve	YES/NO
l) Biologic heart valve	YES/NO
m) Pacemaker	YES/NO
n) Coronary stent	YES/NO
o) Congenital cyanotic heart defect	YES/NO
p) Diabetes	YES/NO
q) Heart valve disease not treated surgically	YES/NO
r) After myocardial infarction	YES/NO

7. Will you remove a tooth with extraction indications if the patient is currently taking acetylsalicylic acid (ASA)?

Yes

Yes, but I will recommend ASA withdrawal

No, I will recommend consultation by cardiologist/internist first

8. Will you remove the tooth with extraction indications if the patient is currently taking the so-called double antiplatelet therapy - acetylsalicylic acid (ASA) and clopidogrel (Plavix®) or ticagrelor (Brilique®)

Yes

Yes, but I will recommend both drugs withdrawal

Yes, but I will recommend one of the drugs withdrawal

No, I will recommend consultation by cardiologist/internist first

9. What percentage of patients do you take in your dental practice?

Anticoagulant drugs _____%

ASA _____ %
Double Antiplatelet Therapy _____ %

Polska wersja ankiety

<https://drive.google.com/file/d/1bL3uNR9xTuJN-PClz73QV2B2YX-xhU91/view?usp=sharing>

English version of the questionnaire

<https://drive.google.com/file/d/1U657GM86vS6gPHo9NXGZEmzZpYbmGL3I/view?usp=sharing>